

Az integrálrepresentációs tétel

Miért pont a Wiener-folyamat

Medvegyev Péter

2009

Az integrálrepresentációs tételek a piac teljességének indoklása során játszanak alapvető szerepet. Két tételt tárgyalunk: Először a Dudley-féle, majd az Itô-féle representációs tételt mutatjuk be. Mind a két tétel arról szól, hogy egy ζ valószínűségi változó milyen körülmények között írható fel, reprezentálható $\zeta = \lambda + \int_0^T Xdw$ módon. Milyen probléma származik abból, hogy a sztochasztikus integrálok csak lokális martingálok és nem valódi martingálok? Természetesen, ha

$$H_T = \lambda + \int_0^T \theta dS$$

és a sztochasztikus integrál valódi martingál, akkor λ éppen a H_T várható értéke, ugyanis a sztochasztikus integrál várható értéke, ha valódi martingál, nulla. Általában azonban a sztochasztikus integrál nem valódi martingál.

Example

Folytonos időhorizonton a sztochasztikus integrál, amely alulról nem korlátos nem használható az árazási képletben ugyanis „arbitrázst” tartalmaz.

Legyen w egy Wiener-folyamat és

$$I(t) \stackrel{\circ}{=} \int_0^t \frac{1}{T-s} dw(s).$$

Emlékeztetünk, hogy valamely M folytonos lokális martingál szerinti sztochasztikus integrál definiálhatóságához az szükséges, hogy az X integrandusra teljesüljön a

$$\mathbf{P}([X \bullet M] < \infty) = \mathbf{P}(X^2 \bullet [M] < \infty) = 1$$

feltétel. Ilyenkor az $X \bullet M$ egy lokális martingál.

A jelen példában a $[0, T)$ szakaszon

$$[I](t) = \int_0^t \frac{1}{(T-u)^2} du = \frac{1}{T-t} - \frac{1}{T} < \infty,$$

vagyis a feltétel teljesül. Ebből következően a $[0, T)$ szakaszon az I sztochasztikus integrál értelmes és egy lokális martingált definiál. Természetesen a $[0, T]$ szakaszon az integrál nem létezik.

Lévy-féle karakterizációs tétel

Az $[I]$ triviálisan egy szigorúan monoton növvő, folytonos és determinisztikus függvény. Az inverzét jelölje

$$f(x) \stackrel{\circ}{=} \frac{xT^2}{1 + Tx}$$

Az f szintén egy szigorúan monoton növvő folytonos függvény és az f a $[0, \infty)$ félegyenest képezi a $[0, T)$ szakaszra. Az $I(f(s))$ kifejezés folytonos lokális martingál a $[0, \infty)$ félegyenesen, amely kvadratikus variációja $[I(f(s))] = [I](f(s)) = s$. A Lévy-féle karakterizációs tétel miatt az $s \mapsto I(f(s))$ egy Wiener-folyamat. A karakterizációs tételre nincsen igazán szükség, ugyanis az integrandus determinisztikus, így közvetlen számolással könnyen látható, hogy az integrál eloszlása normális és az integrálfolyamat független növekményű. Tetszőleges t -re az $I(t)$ eloszlása $N\left(0, \sqrt{[I](t)}\right)$. Ebből már az állítás egyszerűen igazolható.

Hogyan nyomjuk össze a Wiener-folyamatot

Mivel a $\hat{w}(s) \stackrel{\circ}{=} I(f(s))$ egy Wiener folyamat, ezért

$$I(s) = \hat{w}(f^{-1}(s)) = \hat{w}\left(\frac{1}{T-s} - \frac{1}{T}\right).$$

A szintátlépéseket megadó megállási idő

A Wiener-folyamatokra a limesz superior és a limesz inferior végtelenbe tart, így

$$\limsup_{s \rightarrow \infty} \widehat{w}(s) = \limsup_{s \rightarrow \infty} I((f(s))) = \limsup_{t \rightarrow T} I(t) = \infty$$

$$\liminf_{s \rightarrow \infty} \widehat{w}(s) = \liminf_{s \rightarrow \infty} I((f(s))) = \liminf_{t \rightarrow T} I(t) = -\infty$$

Ebből következően a

$$\tau_a \stackrel{\circ}{=} \inf \{t \leq T : I(t) = a\}$$

kifejezés majdnem minden kimenetelre véges és majdnem mindenhol $\tau_a < T$.

Tekintsük az

$$X(t) \doteq \frac{1}{T-t} \chi(t \leq \tau_a)$$

balról folytonos stratégiát. Tegyük fel, hogy az árak alakulását a $[0, T]$ szakaszon egy w Wiener-folyamat írja le. Az X stratégiából származó nyereség a sztochasztikus integrálokra vonatkozó asszociativitási, illetve megállási szabály miatt

$$\begin{aligned}(X \bullet w)(s) &\doteq \int_0^s \frac{1}{T-t} \chi(t \leq \tau_a) dw(t) = \left(\frac{1}{T-t} \chi(t \leq \tau_a) \bullet w \right)(s) \\ &= \left(\chi(t \leq \tau_a) \bullet \left(\frac{1}{T-t} \bullet w \right) \right)(s) = \\ &= (\chi(t \leq \tau_a) \bullet I)(s) = I^{\tau_a}(s) = I(\tau_a \wedge s).\end{aligned}$$

Ebből következően

$$\lim_{s \rightarrow T} (X \bullet w)(s) = (X \bullet w)(T) = a,$$

vagyis ha az árakat egy w Wiener-folyamat írja le, akkor egy tetszőleges $[0, T]$ szakaszon tetszőleges nyereség realizálható. Vagyis folytonos időhorizonton, még a lehető legegyszerűbb esetben is mindenképpen van „arbitrázs”. Az idézőjelet az indokolja, hogy az arbitrázst csak megengedett stratégiák halmazának rögzítése esetén értelmezhetjük és a gondolatmenet lényege, hogy az X stratégia nem „megengedett”.

Definition

Megengedett stratégián olyan θ stratégiákat értünk, amelyekre $\theta \bullet S$ alulról egyenletesen korlátos egy alkalmas a konstanssal.

A jelenség kizárása céljából mindig feltesszük, hogy a nyereségfolyamat alulról korlátos egy rögzített számmal. Ilyenkor természetesen nem lehetséges az arbitrázs, ugyanis az alulról való korlátosság miatt valamely L lokális martingál szerinti sztochasztikus integrál szupermartingál, vagyis veszíti a várható értékét. Ha tehát $(X \bullet L)(T) = H_T \geq 0$, akkor

$$0 = \mathbf{E}((X \bullet L)(0)) \geq \mathbf{E}((X \bullet L)(T)) = \mathbf{E}(H_T) \geq 0.$$

következésképpen $\mathbf{E}(H_T) = 0$, vagyis $H_T \stackrel{m.m.}{=} 0$.

A folytonos időhorizont kézenfekvő módon végtelen számú időpontból áll és ezért tetszőleges véges szakaszon lehet „duplázni”. Az előző példa éppen azt mutatja be, hogy miként. Valójában tetszőleges a esetén, ha τ_a az első időpont, amikor egy w Wiener-folyamat eléri az a időpontot, akkor $\tau_a < \infty$ és $w(\tau_a) = a$, vagyis végtelen időhorizonton egy egyszerű megállítási stratégiával triviálisan lehet arbitrálni. A példa csak azt mutatja meg, hogy ha megengedjük a sztochasztikus integrált mint „kereskedési stratégiát”, akkor már korlátos időhorizonton is el lehet érni az a értéket. Valójában a megállási opciókról szóló tételben a megállási idők korlátossága azt biztosítja, hogy ne lehessen a végtelen számosságú időhorizontot kihasználva „duplázni”. A megengedett stratégiák alulról való korlátosságának megkövetelése hasonló célt szolgál: Korlátot kívánunk szabni a „kockázat” növekedésének.

Definition

Az előző példában a

$$\hat{w}(s) \doteq I((f(s)))$$

egy Wiener-folyamat. Ez indokolja, hogy az

$$I(s) = \hat{w}(f^{-1}(s)) = \hat{w}\left(\frac{1}{T-s} - \frac{1}{T}\right)$$

folyamatot a $[0, T)$ szakaszra „összenyomott” Wiener-folyamatnak hívjuk.

Example

Követelések replikálásában a konstans még véges időhorizonton sem egyértelmű.

Tekintsük az előző példában szereplő I „összenyomott” Wiener-folyamatot és τ_{-a} jelölje az I folyamat $-a$ értékhez tartozó találati idejét. Ha

$$X_a(t) \doteq \frac{1}{T-t} \chi(t \leq \tau_{-a}),$$

és $a \geq 0$, akkor $V_a \doteq a + X_a \bullet w = a + I^{\tau_{-a}} \geq 0$, így az X_a megengedett, ugyanakkor minden a -ra $V_a(T) = a + I(\tau_{-a}) = 0$. Ennek megfelelően a $H_T \doteq 0$ értéket replikáló konstans nem egyértelmű ugyanis az értéke tetszőleges $a \geq 0$ szám lehet.

A konstans nem egyértelmű

Vegyük észre, hogy szemben a véges időhorizont esetével ez nem mond ellent a nincsen arbitrázs feltételnek, ugyanis az $X \stackrel{\circ}{=} X_{a_1} - X_{a_2}$ portfólió nem lesz feltétlenül megengedett, ugyanis a hozzá tartozó értékfolyamat nem lesz alulról korlátos, hiszen a $-X_{a_2} \bullet w$ alulról nem korlátos, ugyanis az $X_{a_2} \bullet w$ csak alulról, de nem felülről korlátos. A probléma a megengedett portfólió fogalmának bevezetésében gyökerezik. Egy másik szokásos megoldás, hogy a megengedett portfóliók halmazát az $\mathcal{L}^2(M)$ térre korlátozzuk, de ez túl „átlátszó” megszorítás.

A lényeges gondolat az, hogy mivel a végtelen számosságú időhorizont miatt az arbitrázs lehetőségét kizárandó a lehetséges stratégiák nem egy lineáris alteret, hanem egy kúpot alkotnak, ezért a replikáló konstans egyértelműsége, szemben a diszkrét és véges időhorizonttal, már nem következik a modell közgazdasági feltételeiből. Mivel a sztochasztikus integrál nem feltétlenül valódi martingál, ezért a matematikai modell sem garantálja a replikáló portfólióban az induló konstans egyértelműségét.

Ha valamely H_T integrálható változóra

$$H_T = a + (X \bullet L)(T),$$

ahol az L egy folytonos lokális martingál és az X megengedett, akkor

$$\mathbf{E}(H_T) = a + \mathbf{E}((X \bullet L)(T)) \leq a + \mathbf{E}((X \bullet L)(0)) = a$$

ugyanis az $X \bullet L$ alulról korlátos lokális martingál, így szupermartingál, tehát veszíti a várható értéket. Vagyis a reprezentáló konstans nem lehet kisebb mint a várható érték, de semmi sem garantálja, hogy a reprezentáló konstans éppen a várható érték.

Example

Integrálreprezentáció többdimenziós Wiener-folyamat esetén.

Az alább tárgyalt Itô-féle reprezentációs tételben az előállítandó változónak a w Wiener-folyamat által generált filtrációra nézve mérhetőnek kell lenni. A Dudley-féle tételben azonban csak a filtráció folytonosságára van szükség. Ez teljesül például akkor, ha a filtrációt egy többdimenziós Wiener-folyamat definiálja, miközben a reprezentálást csak az egyik koordináta segítségével akarjuk elvégezni. A Dudley-féle tétel szerint az előállítás ilyenkor is megvalósítható. Vagyis ha az X stratégia nem mérhető az integrátor által generált filtrációra nézve, akkor esetlegesen az integrátor által generált filtrációra nem mérhető változó is előállítható sztochasztikus integrálként.

Egy példa a Dudley-tételhez

Erre tekinthetjük a következő példát: Legyen (w_1, w_2) egy két-dimenziós Wiener-folyamat. Legyen

$$E(t) \doteq \exp\left(w_2(t) - \frac{t}{2}\right).$$

Legyen továbbá $a > 1$ és

$$\tau_a \doteq \inf\{t < T : a + I(t) = E(t)\},$$

ahol ismét

$$I(t) \doteq \int_0^t \frac{1}{T-s} dw_1(s), \quad t < T$$

a w_1 Wiener-folyamat már látott „összenyomása”.

A megengedett stratégia konstruálása

Miként korábban láttuk az I „összenyomott” Wiener-folyamat a $[0, T)$ szakaszon a $-\infty$ és ∞ között ingadozik, az E trajektóriái, mivel folytonosak, külön-külön korlátosak a $[0, T]$ kompakt szakaszon, ezért $\tau_a < T$. Világos, hogy a τ_a megállási idő a (w_1, w_2) által generált filtrációra nézve. Legyen a $[0, T]$ szakaszon

$$X(s) \stackrel{\circ}{=} \frac{1}{T-s} \chi(s \leq \tau_a).$$

Felhasználva, hogy $E \geq 0$ és $E(0) = 1 < a = a + I(0)$ azonnal látható, hogy a $[0, \tau_a)$ szakaszon az $a + I$ az E felett van, így ezen a szakaszon

$$a + I(t) \stackrel{\circ}{=} a + \int_0^t \frac{1}{T-s} dw_1(s) \geq E(t) \geq 0.$$

Vagyis $X \bullet w_1 \geq -a$, így az X egy megengedett befektetési stratégia a w_1 -re nézve.

Ha $H_T \stackrel{\circ}{=} E(\tau_a)$, akkor

$$\begin{aligned} H_T &\stackrel{\circ}{=} E(\tau_a) = a + I(\tau_a) = a + \int_0^{\tau_a} \frac{1}{T-s} dw_1(s) = \\ &= a + \int_0^T X dw_1(s) = a + (X \bullet w_1)(T), \end{aligned}$$

vagyis a w_1 egy a (w_1, w_2) által generált filtrációra nézve mérhető változót is elő tudott állítani. (Persze az X csak a (w_1, w_2) -re nézve adaptált.)

A replikáló konstans nem a várható érték

A megállási opciókról szóló tétel miatt, felhasználva, hogy az E martingál és $\tau_a \leq T$

$$\mathbf{E}(H_T) \stackrel{\circ}{=} \mathbf{E}(E(\tau_a)) = \mathbf{E}(E(0)) = 1,$$

így a replikáló stratégiában a replikáló konstans értéke $a > 1$ nem a várható érték..

Ugyanakkor az Itô-formulával való elemi számolással

$$E(t) = 1 + \int_0^t E(s) dw_2(s).$$

Az $E(t)$ triviálisan nem negatív. Következésképpen $E \bullet w_2 \geq -1$.

$$H_T \stackrel{\circ}{=} E(\tau_a) = 1 + \int_0^{\tau_a} E(s) dw_2(s) = 1 + \int_0^T \chi(s \leq \tau_a) E(s) dw_2(s),$$

így van olyan replikáló, alulról korlátos portfólió is, ahol a konstans éppen a H_T tranzakció várható értéke. Vegyük észre, hogy ebben az előállításban sem mérhető a H_T az integrálban szereplő Wiener-folyamat által generált filtrációra nézve. Ebben az előállításban szereplő integrál azonban martingál a (w_1, w_2) által generált filtrációra nézve.

Emlékeztetünk, hogy ha w egy Wiener-folyamat, akkor az $\mathcal{F}_t^0 \doteq \sigma(w(s) : s \leq t)$ egy filtrációt definiál. Ellenpéldával megmutatható, hogy az \mathcal{F}^0 nem jobbról folytonos. Megmutatható, hogy ha az \mathcal{F}^0 helyett az $\mathcal{F}_t \doteq \sigma(\mathcal{F}_t^0 \cup \mathcal{N})$ kibővített filtrációt tekintjük, akkor az \mathcal{F} jobbról folytonos lesz, vagyis ilyenkor $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t+} \doteq \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s$. Mivel a w folytonos, ezért minden t -re $w(t) = \lim_{s \nearrow t} w(s)$. Ezért a $w(t)$ mérhető az $\mathcal{F}_{t-}^0 \doteq \sigma(w(s) : s < t)$ σ -algebrára. Ebből következően $\mathcal{F}_t^0 = \mathcal{F}_{t-}^0 \doteq \sigma(\mathcal{F}_s^0 : s < t)$. Ez nyilván teljesül az \mathcal{F} kibővített filtrációra is. Ezt úgy szokás mondani, hogy az \mathcal{F} balról is folytonos, és mivel jobbról is folytonos, ezért az \mathcal{F} filtrációt folytonosnak mondjuk.

Az utolsó három példában tárgyalt jelenségek háttérében a következő állítás áll:

Theorem (Dudley)

Legyen w egy Wiener-folyamat és \mathcal{F} legyen a w által generált kibővített filtráció. Tetszőleges ξ \mathcal{F}_T -mérhető változó esetén létezik $X \in \mathcal{L}_{loc}^2(w)$ folyamat, amelyre

$$\xi = \int_0^T X dw.$$

Az állítás akkor is érvényes, ha az \mathcal{F} folytonos és a w Wiener-folyamat az \mathcal{F} -re nézve.

A bizonyításban használt legfőbb eszköz a következő, korábban már felhasznált észrevétel: Tetszőleges $0 \leq a < b$ esetén az

$$I_{a,b}(t) \stackrel{\circ}{=} \int_a^t \frac{1}{b-s} dW(s)$$

sztochasztikus integrál értelmes, folytonos az $[a, b)$ szakaszon és ha $t \nearrow b$, akkor az $I(t, \omega)$ trajektóriái majdnem minden kimenetelre a $-\infty$ és a $+\infty$ között ingadoznak. Az I folyamat tekinthető úgy mintha egy Wiener-folyamatot „összenyomtunk” volna az a és a b időpontok közé.

Első lépésben belátjuk, hogy tetszőleges $t_n \nearrow T$ sorozat esetén van olyan (ξ_n) sorozat, hogy minden n -re ξ_n mérhető az \mathcal{F}_{t_n} σ -algebra szerint és majdnem mindenhol $\xi_n \rightarrow \xi$. Ennek igazolása a következő: Ha $\eta \stackrel{\circ}{=} \arctan \xi$, akkor az η korlátos, így a Lévy-féle martingál konvergencia tétel miatt majdnem mindenhol

$$\eta_n \stackrel{\circ}{=} \mathbf{E}(\eta \mid \mathcal{F}_{t_n}) \rightarrow \mathbf{E}(\eta \mid \sigma(\mathcal{F}_{t_n})) = \mathbf{E}(\eta \mid \mathcal{F}_{T-}).$$

Ugyanakkor az \mathcal{F} a feltétel szerint balról folytonos, vagyis $\mathcal{F}_{T-} = \mathcal{F}_T$, így $\mathbf{E}(\eta \mid \mathcal{F}_{T-}) = \mathbf{E}(\eta \mid \mathcal{F}_T) = \eta$. Az (η_n) segítségével a (ξ_n) sorozat már könnyen definiálható:

$$\xi_n \stackrel{\circ}{=} \tan(\eta_n) \rightarrow \tan(\eta) = \xi.$$

A majdnem mindenhol való konvergenciából következnek a sztochasztikus konvergencia. Ebből következően megadható olyan (ξ_{n_k}) részsorozat, amelyre

$$\mathbf{P} \left(|\xi_{n_k} - \xi| > \frac{1}{k^3} \right) < \frac{1}{k^2}.$$

Az egyszerűbb jelölés kedvéért az eredeti sorozat helyett vegyük ezt a részsorozatot.

$$\begin{aligned} & \mathbf{P} \left((n+1) |\zeta_{n+1} - \zeta_n| > \frac{4}{n^2} \right) = \\ & = \mathbf{P} \left(|\zeta_{n+1} - \zeta_n| > \frac{4}{n^2(n+1)} \right) \leq \\ & \leq \mathbf{P} \left(|\zeta_{n+1} - \zeta| > \frac{1}{n^2(n+1)} \right) + \mathbf{P} \left(|\zeta_n - \zeta| > \frac{3}{n^2(n+1)} \right) \leq \\ & \leq \mathbf{P} \left(|\zeta_{n+1} - \zeta| > \frac{1}{(n+1)^3} \right) + \mathbf{P} \left(|\zeta_n - \zeta| > \frac{1}{n^3} \right) \leq \\ & \leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n^2} \end{aligned}$$

Az integrandus meghatározása

Tekintsük a

$$I_n(t) \doteq \int_{t_n}^t \frac{1}{t_{n+1} - s} dw(s)$$

integrálokat. Az I_n egy a $[t_n, t_{n+1})$ intervallumba „beszorított” Wiener-folyamat. Miként megjegyeztük ha $t \nearrow t_{n+1}$, akkor az I_n integrálfolyamat a $\pm\infty$ között ingadozik és mivel az I_n folyamat folytonos, ezért

$$\begin{aligned} \tau_n &\doteq \inf \{s \geq t_n : I_n(s) = \zeta_n - \zeta_{n-1}\} = \\ &= \inf \{s \geq t_n : I_n(s) - (\zeta_n - \zeta_{n-1}) = 0\} < t_{n+1}. \end{aligned}$$

Mivel a $\zeta_n - \zeta_{n-1}$ változó \mathcal{F}_{t_n} -mérhető könnyen belátható, hogy az

$$I_n(s) - \zeta_n - \zeta_{n-1}, \quad t_{n+1} > s \geq t_n$$

folyamat adaptált és folytonos a $[t_n, t_{n+1})$ szakaszon, így a τ_n találati idő megállási idő.

Az integrandus meghatározása

A $0 \leq s \leq t_1$ halmazon az X legyen nulla és indukcióval a $(t_n, t_{n+1}]$ szakaszokon legyen

$$\begin{aligned} X(s, \omega) &\stackrel{\circ}{=} \begin{cases} 1/(t_{n+1} - s) & \text{ha } t_n < s \leq \tau_n \\ 0 & \text{ha } \tau_n < s \leq t_{n+1} \end{cases} = \\ &= \frac{1}{t_{n+1} - s} \chi(s \leq \tau_n). \end{aligned}$$

Tetszőleges n -re a $\tau_n < t_{n+1}$ miatt

$$\begin{aligned} \int_{t_n}^{t_{n+1}} X^2 d[w] &= \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{1}{(t_{n+1} - s)^2} \chi(s \leq \tau_n) ds = \\ &= \int_{t_n}^{\tau_n} \frac{1}{(t_{n+1} - s)^2} ds = \left[\frac{1}{t_{n+1} - s} \right]_{t_n}^{\tau_n} = \\ &= \frac{1}{t_{n+1} - \tau_n} - \frac{1}{t_{n+1} - t_n} < \infty. \end{aligned}$$

Az integrál értéke kompakt részintervallumokon

Így minden n -re $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^2$ a $[t_n, t_{n+1}]$ szakaszon, következésképpen a sztochasztikus integrál additivitása miatt $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^2$ a $[0, t_{n+1}]$ szakaszon is. Ebből következően az

$$\int_0^{t_{n+1}} X dw$$

integrál értelmes. Ugyanakkor

$$\begin{aligned} \int_0^{t_{n+1}} X dw &= \sum_{k \leq n} \int_{t_k}^{t_{k+1}} X dw = \sum_{k \leq n} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \frac{1}{t_{k+1} - s} \chi(s \leq \tau_k) dw = \\ &= \sum_{k \leq n} \int_{t_k}^{\tau_k} \frac{1}{t_{k+1} - s} dw = \sum_{k \leq n} I_k(\tau_k) = \\ &= \sum_{k \leq n} (\zeta_k - \zeta_{k-1}) = \zeta_n, \end{aligned}$$

ahol értelemszerűen feltettük, hogy $\zeta_0 \stackrel{\circ}{=} 0$.

A majorált konvergencia tétel használata

Ha az X a teljes $[0, T]$ szakaszon is integrálható, akkor a majorált konvergencia tétel miatt, felhasználva, hogy az egy pontból álló halmazok az integrátor folytonossága miatt elhagyhatóak, vagyis hogy a $[0, T]$ és a $(0, T)$ halmazon való integrálok egybeesnek

$$\int_0^T Xdw = \int_0^T \lim_{n \rightarrow \infty} \chi((0, t_{n+1}]) Xdw = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{t_{n+1}} Xdw = \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n = \zeta,$$

ami éppen a bizonyítani kívánt reprezentáció.

Az integrálhatósági kritérium felírása

Az X integrálhatóságához meg kell mutatni, hogy $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^2(w)$, vagyis hogy majdnem minden kimenetelre

$$\int_0^T X^2(s) ds < \infty.$$

Legyen

$$\begin{aligned} \gamma_n &\stackrel{\circ}{=} [I_n](t_{n+1}) = \int_{t_n}^{\tau_n} \frac{1}{(t_{n+1} - s)^2} ds = \\ &= \frac{1}{t_{n+1} - \tau_n} - \frac{1}{t_{n+1} - t_n} \stackrel{\circ}{=} f_n^{-1}(\tau_n). \end{aligned}$$

Evidens módon $\int_0^T X^2(s) ds = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n$. Meg kell mutatni, hogy $\sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n < \infty$ majdnem mindenhol.

A változók interpretációja

Az f_n^{-1} függvény éppen a $[t_n, t_{n+1})$ intervallumot képezi a $[0, \infty)$ félegyenesre. Ha $\widehat{w}_n(s) \doteq I_n(f_n(s))$ a megfelelő „széthúzott” Wiener-folyamat, akkor

$$\widehat{w}_n(\gamma_n) = \widehat{w}_n(f_n^{-1}(\tau_n)) = I_n(\tau_n) = \zeta_n - \zeta_{n-1}$$

és mivel az f és az f^{-1} szigorúan monoton nő, valójában γ_n az első olyan időpont, ahol a \widehat{w}_n Wiener-folyamat eltalálja a $\zeta_n - \zeta_{n-1}$ változót. Vegyük észre, hogy a $\zeta_n - \zeta_{n-1}$ az \mathcal{F}_{t_n} σ -algebrára nézve mérhető, a \widehat{w}_n pedig a t_n időpontból indított I_n áttranszformálása. Következésképpen az I_n , így a \widehat{w}_n is független a $\zeta_n - \zeta_{n-1}$ változóktól.

A teljes valószínűség tétele

Vizsgáljuk meg a γ_n eloszlását. Az egyszerűség kedvéért az n indexet elhagyva tetszőleges B Borel-mérhető halmazra, ha F jelöli a $\xi \stackrel{\circ}{=} \xi_n - \xi_{n-1}$ eloszlását, akkor

$$\mathbf{P}(\gamma \in B) \stackrel{\circ}{=} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{P}(\gamma \in B \mid \xi = x) dF(x).$$

Vegyük észre, hogy ez az egyenlőség egy triviális azonosság. Bármely valószínűség felírható tetszőleges másik változóra vonatkozó feltételes valószínűségek integráljaként. Az azonosság felírásához pusztán a feltételes valószínűség definíciója szükséges és az, hogy a feltételes valószínűség mindig létezik, vagy ami ugyanaz, hogy a feltételes várható érték integrálható változó esetén mindig létezik. Kérdés csak az, hogy hogyan lehet kiszámolni a feltételes valószínűséget?

Az egyetlen széles körben használható feltétel a következő:

Lemma

Ha a ξ és az η független, véges vagy végtelen dimenziós vektorváltozók és $Z(x, y)$ egy két-változós, szorzat-mérhető függvény, akkor

$$\mathbf{E}(Z(\xi, \eta) \mid \eta = y) = \mathbf{E}(Z(\xi, y))$$

vagyis függetlenség esetén a feltétel „behelyettesíthető és elhagyható”. A ξ és az η képtere tetszőleges mérhető tér lehet, amelyre nézve a ξ és az η valószínűségi változó és a Z szorzatmérhető..

A feltételes valószínűség kiszámolása

Ha $f = \chi_A \chi_B$ alakú mérhető téglá, akkor

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(Z(\xi, \eta) \mid \eta) &= \mathbf{E}(\chi_A(\xi) \chi_B(\eta) \mid \eta) = \chi_B(\eta) \mathbf{E}(\chi_A(\xi) \mid \eta) = \\ &= \chi_B(\eta) \mathbf{E}(\chi_A(\xi)),\end{aligned}$$

így a regressziós függvény definíciója miatt

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(Z(\xi, \eta) \mid \eta = y) &= \chi_B(y) \mathbf{E}(\chi_A(\xi)) = \mathbf{E}(\chi_B(y) \chi_A(\xi)) = \\ &= \mathbf{E}(Z(\xi, y)).\end{aligned}$$

Az általános eset a lépcsős függvényekkel való közelítéssel kapható.

A feltételes valószínűség kiszámolása

Jelölje $C [0, \infty)$ a nullából induló folytonos függvények terét. A konkrét helyzetben az egyik változó az Ω -ból a $C [0, \infty)$ térbe képező vektor értékű változó, a másik pedig az \mathbb{R} félegyenes. A $C [0, \infty)$ teret a pontfunkcionálok által generált σ -algebrával látjuk el. A $Z(x, y)$ függvény értéke legyen az az első időpont, amikor az x függvény eléri az y értéket. Ha $y > 0$

$$\begin{aligned}\{(x, y) : Z(x, y) > \lambda\} &= \{(x, y) : x(t) < y, \forall t \leq \lambda\} = \\ &= \{(x, y) : x(r) < y, \forall r \leq \lambda, r \in \mathbb{Q}\}.\end{aligned}$$

Az $\{(x, y) : x(t) < y\}$ halmaz karakterisztikus függvénye, a pontfunkcionálok által definiált mérhetőség definíciója miatt az x szerint mérhető az y szerint balról folytonos, így szorzat mérhető. Hasonlóan járhatunk el, ha $y < 0$. Ha $y = 0$, akkor a halmaz üres minden $\lambda \geq 0$ esetén.

A feltételes valószínűség kiszámolása

Az idézet tétel miatt ha

$$\gamma^{(x)} \doteq \inf \{s \geq 0 : w(s) = x\},$$

akkor

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\gamma \in B) &\doteq \int_{\mathbb{R}} \mathbf{P}(\gamma \in B \mid \xi = x) dF(x) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{P}(\gamma^{(x)} \in B) dF(x). \end{aligned}$$

A találati idő sűrűségfüggvénye

Mivel $\gamma^{(x)}$ az x pont találati ideje, akkor a $\gamma^{(x)}$ sűrűségfüggvény éppen

$$h(u) = |x| \frac{1}{\sqrt{u^3 2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2u}\right), \quad u \geq 0.$$

A sűrűségfüggvény képletéből

$$h(u) \leq \frac{|x|}{u^{3/2}}$$

vagyis

$$\mathbf{P}\left(\gamma^{(x)} \geq u\right) \leq |x| \int_u^\infty \frac{1}{y^{3/2}} dy = \frac{|x|}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{y}} \right]_u^\infty = \frac{|x|}{2\sqrt{u}}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P} \left(\gamma_n \geq \frac{1}{n^2} \right) &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{P} \left(\gamma_n^{(x)} \geq \frac{1}{n^2} \right) dF(x) = \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \min \left(\mathbf{P} \left(\gamma_n^{(x)} \geq \frac{1}{n^2} \right), 1 \right) dF(x) \leq \\
 &\leq \int_{\mathbb{R}} \min \left(\frac{|x|}{\sqrt{1/n^2}}, 1 \right) dF(x) = \int_{\mathbb{R}} \min(n|x|, 1) dF(x) = \\
 &= \mathbf{E}(\min(n|\xi_n - \xi_{n-1}|, 1)) \leq \\
 &\leq \mathbf{P} \left(n|\xi_n - \xi_{n-1}| > \frac{4}{(n-1)^2} \right) + 1 \cdot \frac{4}{(n-1)^2}.
 \end{aligned}$$

A tárgyalás elején levő becslés alapján

$$\mathbf{P} \left(n |\xi_n - \xi_{n-1}| > \frac{4}{(n-1)^2} \right) \leq \frac{2}{(n-1)^2},$$

ezért

$$\mathbf{P} \left(\gamma_n \geq \frac{1}{n^2} \right) \leq \frac{2}{(n-1)^2} + \frac{4}{(n-1)^2} = \frac{6}{(n-1)^2}.$$

A $\sum 6/(n-1)^2$ sor konvergens, így a Borel–Cantelli lemma miatt majdnem minden kimenetelre véges sok indextől eltekintve $\gamma_n < 1/n^2$, vagyis a $\sum \gamma_n$ sor majdnem minden kimenetelre konvergens, tehát az integrálhatóság teljesül.

Az Itô-féle reprezentációs tétel

A Dudley tételben az előállítás nem volt egyértelmű, ennek megfelelően nem tudtuk garantálni, hogy a reprezentációban szereplő konstans éppen a ζ változó várható értéke legyen. Az alább tárgyalandó Itô-féle reprezentációs tételben a legfontosabb az, hogy az előállításban szereplő konstans éppen a várható érték. Ugyancsak érdemes hangsúlyozni, hogy az előállításban szereplő sztochasztikus integrál nem csak lokális martingál, hanem valódi martingál, ugyanis az előállításban szereplő integrál X integrandusára $X \in \mathcal{L}^2(w)$. Ugyanakkor ennek ára is van. Egyrészt a ζ nem lehet tetszőleges, fel kell tenni, hogy négyzetesen integrálható, másrészt a ζ -nek mérhetőnek kell lenni az előállító Wiener-folyamat által generált filtrációban szereplő σ -algebrára nézve. Az eszközarázási képletben a beárazható követelések mérhetőségére szigorú megkötéseket kell tenni. A modellben a filtrációt az alapul vett Wiener-folyamatok generálják. Ennek oka éppen az alább tárgyalt tételben rejlik.

Mikor is lesz egy sztochasztikus integrál martingál?

A kérdésre csak elégséges feltételeket tudunk adni. Az integrál konstrukciója alapján, ha $X \in \mathcal{L}^2(w)$, vagyis ha $\mathbf{E} \left(\int_0^T X^2(s) ds \right) < \infty$, akkor $X \bullet w \in \mathcal{H}^2$, így martingált kapunk. A feltétel az $X \bullet w \in \mathcal{H}^2$ -re nézve szükséges és elegendő. A Davis-egyenlőtlenséggel a feltétel élesíthető. Ha

$$\mathbf{E} \left(\sqrt{\int_0^T X^2(s) ds} \right) = \mathbf{E} \left(\sqrt{[X \bullet w](T)} \right) < \infty,$$

akkor

$$\mathbf{E} \left(\sup_{s \leq T} |X \bullet w(s)| \right) < \infty,$$

vagyis $X \bullet w \in \mathcal{H}^1$, vagyis az integrál valódi martingál és a feltétel az $X \bullet w \in \mathcal{H}^1$ -re nézve szükséges és elegendő.

Mikor is lesz egy sztochasztikus integrál martingál?

Mind a két esetben a sztochasztikus integrál egyenletesen integrálható martingál. Nincs azonban általános kritérium még az integrál egyenletes integrálhatóságának eldöntésére sem. A gyök függvény konkáv, így a Jensen-egyenlőtlenség miatt

$$\mathbf{E} \left(\sqrt{\int_0^T X^2(s) ds} \right) \leq \sqrt{\mathbf{E} \left(\int_0^T X^2(s) ds \right)},$$

vagyis a

$$\mathbf{E} \left(\sqrt{\int_0^T X^2(s) ds} \right) < \infty$$

kritérium valóban erősebb, vagyis előfordulhat, hogy

$\mathbf{E} \left(\int_0^T X^2(s) ds \right) = \infty$ és az integrál mégis martingál.

A generált filtráció

Legyen tehát w egy Wiener-folyamat és jelölje \mathcal{F} a w által generált filtrációt. Emlékeztetünk, hogy $\mathcal{F}_t \doteq \sigma(\mathcal{F}_t^0 \cup \mathcal{N})$, ahol \mathcal{F}^0 a w által generált filtráció. Könnyen látható, hogy minden $F \in \mathcal{F}_t$ halmazhoz található olyan $F_0 \in \mathcal{F}_t^0$ és N nullmértékű halmaz, hogy $F \Delta F_0 = N$. Az \mathcal{F}_t^0 , definíció szerint, éppen a $w(s)$, $s \leq t$ alakú változók által generált legszűkebb σ -algebra. Világos, hogy ez a σ -algebra megegyezik a $w(s_1) - w(s_2)$, $s_1, s_2 \leq t$ alakú növekmények által generált σ -algebrával. Ugyancsak emlékeztetünk, hogy valamely véges számú $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ változók által generált σ -algebra minden eleme felírható

$$\{\omega : (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)(\omega) \in B\}$$

módon, ahol B az \mathbb{R}^m egy tetszőleges Borel-mérhető halmaza. Vagyis a $(\xi_k)_{k=1}^m$ változók által generált σ -algebra éppen a Borel-halmazok inverzképeinek halmaza.

A generált filtráció

Az is világos, hogy ha vesszük a w növekményeinek összes lehetséges véges elemű részalmazát és minden véges számú függvényből álló halmaz esetén tekintjük az ezen véges számú függvény által generált σ -algebrát, majd tekintjük ezen σ -algebrák unióját, akkor egyrészt metszet zárt rendszert kapunk, másrészt az így kapott \mathcal{S} halmazcsalád generálja az \mathcal{F}_t^0 σ -algebrát. A monoton osztály tételből evidens, hogy tetszőleges ν (véges) előjeles mérték esetén ha $\nu(S) = 0$ minden $S \in \mathcal{S}$ halmazra, akkor a $\nu = 0$, vagyis az \mathcal{S} elemei egyértelműen meghatározzák az előjeles mértékeket. (Venni kell az összes olyan korlátos u függvényt, amelyre $\int_{\Omega} u d\nu = 0$. Mivel a ν mérték véges, ezért a lehetséges u függvények halmaza lineáris tér.)

Lemma

Jelölje \mathcal{F} valamely w Wiener-folyamat által generált filtrációt. Ha a h végigfutja $[0, T]$ szakaszon értelmezett determinisztikus lépcsős függvényosztály elemeit, akkor az

$$(\mathcal{E}(h \bullet w))(T) \doteq \exp \left(\int_0^T h dw - \frac{1}{2} \int_0^T h^2 d[w] \right)$$

alakú függvények által generált lineáris tér sűrű az $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbf{P})$ térben. A $T = \infty$ megengedett, azonban ilyenkor is a h elemeinek tartója korlátos kell, hogy legyen, ellenkező esetben az integrálok értelmetlenek.

Merőlegesség felírása

Jelölje \mathcal{U} az $(\mathcal{E}(h \bullet w))(T)$ alakú függvények által generált lineáris teret. Megmutatjuk, hogy ha a g függvény merőleges az \mathcal{U} -ra, akkor $g \stackrel{m.m.}{=} 0$. Vagyis ha minden

$$h \stackrel{\circ}{=} \sum_{k=0}^m \lambda_k \chi((t_k, t_{k+1}]),$$

esetén

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{E} \left(\exp \left(\sum_k \lambda_k \Delta w(t_k) - \frac{1}{2} \sum_k \lambda_k^2 \Delta t_k \right) \cdot g \right) \stackrel{\circ}{=} \\ &\stackrel{\circ}{=} C \cdot \mathbf{E} \left(\exp \left(\sum_k \lambda_k \Delta w(t_k) \right) \cdot g \right), \end{aligned}$$

akkor $g = 0$.

Evidens módon tetszőleges (λ_k, t_k) sorozat esetén $C \neq 0$, vagyis feltehetjük, hogy

$$\mathbf{E} \left(\exp \left(\sum_k \lambda_k \Delta w(t_k) \right) \cdot g \right) = 0.$$

A következő gondolatmenet célja, hogy a λ_k valós paraméterek helyébe az $i\lambda_k$ imaginárius értékeket tegyük.

Rögzítsük a λ_0 kivételével a λ_k konstansokat. Az

$$\exp(\lambda_k \Delta w(t_k)), \quad k = 1, 2, \dots, m$$

alakú kifejezések lognormálisak, így van szórásuk, vagyis $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ -beli elemek. Mivel függetlenek egymástól, ezért a négyzetük szorzatának várható értéke éppen a négyzetek várható értékeinek szorzata. Így a szorzatuk is $L^2(\Omega)$ -beli. A g szintén $L^2(\Omega)$ -ban van. Két négyzetesen integrálható függvény szorzata integrálható, következésképpen a $g \in L^2(\Omega)$ -vel szorozva az $\exp(\sum_{k=1}^m \lambda_k \Delta w(t_k))$ változót egy $L^1(\Omega)$ -beli u függvényt kapunk. Mivel erre a későbbiekben szükségünk lesz érdemes hangsúlyozni, hogy ugyanez a gondolatmenet érvényes az $\exp(\lambda_k |\Delta w(t_k)|)$ változókra is, egyedül azt kell csak felhasználni, hogy ha ξ normális eloszlású, akkor az $\exp(|\xi|)$ változónak van szórása.

Legyen $\zeta \cong N(0, \sigma)$. $\mathbf{E} \left((\exp(|\zeta|))^2 \right) = \mathbf{E} (2 \exp(|\zeta|))$ és így elegendő az $\mathbf{E} (\exp(c|\zeta|))$ -vel, $c \geq 0$ és $\zeta \cong N(0, 1)$ várható értékkel foglalkozni. A lognormális eloszlás várható értékének végeessége miatt

$$\begin{aligned} \mathbf{E} (\exp(c|\zeta|)) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(c|x|) \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \exp(cx) \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \leq \\ &\leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(cx) \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx < \infty. \end{aligned}$$

A momentumgeneráló függvény felírása

$$\begin{aligned} M(\lambda_0) &\stackrel{\circ}{=} \mathbf{E} \left(\exp \left(\sum_k \lambda_k \Delta w(t_k) \right) \cdot g \right) \stackrel{\circ}{=} \\ &\stackrel{\circ}{=} \mathbf{E} (\exp(\lambda_0 \Delta w(t_0)) \cdot u) \stackrel{\circ}{=} \\ &\stackrel{\circ}{=} \int_{\Omega} \exp(\lambda_0 \Delta w(t_0)) \cdot u d\mathbf{P} \stackrel{\circ}{=} \\ &\stackrel{\circ}{=} \int_{\Omega} \exp(\lambda_0 \Delta w(t_0)) d\mu \equiv 0, \end{aligned}$$

ahol $\mu(A) \stackrel{\circ}{=} \int_A u d\mathbf{P}$ egy előjeles mérték. Minden előjeles mérték definíció szerint csak véges értékeket vehet fel, tehát fontos, hogy az u integrálható a \mathbf{P} -re nézve.

A momentumgeneráló függvény deriválása

Következésképpen az M a μ előjeles mérték momentumgeneráló függvénye. Könnyen látható, hogy az M végtelen sokszor deriválható és a deriválás elvégezhető az integrál alatt. (Emlékeztetünk, hogy ehhez elegendő, hogy a magfüggvény paraméter szerinti parciális deriválása után a deriváltak legyen deriváláshoz használt paramétertől független integrálható majoránsa. Mivel a deriválás lokális művelet, az integrálható majoráns elegendő ha a deriválandó paraméter tetszőleges értéke esetén egy a paraméter érték köré rajzolt nyílt sávban létezik.) Formálisan az integrál alatt deriválva $M^{(n)}(\lambda_0) = \int_{\Omega} (\Delta w(t_0))^n \exp(\lambda_0 \Delta w(t_0)) d\mu$. Mivel alkalmas k konstanssal $x^n \exp(x) \leq k \exp(x)$, $x \geq 0$, ha $\lambda_0 \in (\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)$, akkor

$$\begin{aligned} |(\Delta w(t_0))^n \exp(\lambda_0 \Delta w(t_0))| &\leq |(\Delta w(t_0))^n| \exp(|\lambda_0 \Delta w(t_0)|) \leq \\ &\leq k \exp((|\lambda_0| + \varepsilon) \Delta w(t_0)) \end{aligned}$$

amely kifejezés miként láttuk, integrálható.

A deriválást elvégezve az $M(\lambda) \equiv 0$ alapján

$$M^{(n)}(\lambda_0) = \int_{\Omega} (\Delta w(t_0))^n \exp(\lambda_0 \Delta w(t_0)) d\mu = 0.$$

Ha $\lambda_0 = 0$, akkor

$$\int_{\Omega} (\Delta w(t_0))^n d\mu = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Tekintsük az

$$\int_{\Omega} \exp(i\lambda_0 \Delta w(t_0)) d\mu = \int_{\Omega} \sum_n \frac{(i\lambda_0 \Delta w(t_0))^n}{n!} d\mu.$$

integrált. A bizonyítás alapgondolata, hogy az összegzést és az integrálást fel tudjuk cserélni. Ezt a majorált konvergencia tétellel fogjuk igazolni. A $\Delta w(t_0)$ eloszlása normális, így miként már megjegyeztük az $\exp(|\lambda_0 \Delta w(t_0)|)$ változónak van szórása. Az $u \in L^2(\Omega)$ miatt

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sum_n \frac{|(i\lambda_0 \Delta w(t_0))|^n}{n!} d|\mu| &= \int_{\Omega} \sum_n \frac{|\lambda_0 \Delta w(t_0)|^n}{n!} d|\mu| = \\ &= \int_{\Omega} \exp(|\lambda_0 \Delta w(t_0)|) d|\mu| = \int_{\Omega} \exp(|\lambda_0 \Delta w(t_0)|) |u| d\mathbf{P} < \infty. \end{aligned}$$

Ezt felhasználva az alábbi sorban használhatjuk a majorált konvergencia tételt:

$$\int_{\Omega} \exp(i\lambda_0 \Delta w(t_0)) d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\lambda_0)^n}{n!} \int_{\Omega} (\Delta w(t_0))^n d\mu = 0.$$

Vagyis minden λ_0 esetén

$$\mathbf{E}(\exp(i\lambda_0 w \Delta(t_0)) \cdot u) = 0.$$

Ezt követően a g helyébe írjunk az

$$\exp(i\lambda_0 w \Delta(t_0)) g$$

függvényt. Mivel a komplex exponenciális függvény korlátos az új függvény szintén négyzetesen integrálható marad. Ezt követően vegyük a λ_1 változót, majd ismételjük meg a gondolatmenetet a λ_1 -re stb. Véges lépés után az

$$M(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \stackrel{\circ}{=} \mathbf{E} \left(\exp \left(\sum_k i\lambda_k \Delta w(t_k) \right) \cdot g \right) \equiv 0$$

azonossághoz jutunk.

A monoton osztály tétel használata

Az olyan $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ korlátos függvények, amelyekre

$$\mathbf{E}(f(\Delta w(t_1), \dots, \Delta w(t_k)) \cdot g) = 0$$

λ -rendszer alkotnak. Az $\exp(i\lambda_k x)$ korlátos függvények π -rendszer alkotnak, így alkalmazhatjuk a monoton osztály tételt. Következésképpen minden $f(x_1, \dots, x_m)$ Borel-mérhető, korlátos függvényre

$$\mathbf{E}(f(\Delta w(t_1), \dots, \Delta w(t_k)) \cdot g) = 0.$$

Ha $f = \chi_B$, ahol B az \mathbb{R}^n egy Borel-mérhető halmaza, akkor

$$\mathbf{E}(\chi_B(\Delta w(t_1), \dots, \Delta w(t_k)) \cdot g) = 0.$$

A generált σ -algebra korábban említett konstrukciója miatt ha

$$A \in \sigma(\Delta w(t_0), \dots, \Delta w(t_m)) = \sigma(w(t_0), \dots, w(t_m)),$$

akkor $\mathbf{E}(\chi_A g) = 0$.

A sűrűégi lemma bizonyítása

Vegyük észre, hogy a

$$v(A) \doteq \int_A g d\mathbf{P}$$

egy előjeles mérték. A monoton osztály tétel miatt a már korábban említett észrevétel alapján

$$\mathbf{E}(\chi_A g) = 0, \quad \text{ha } A \in \sigma(w(s), s \leq T) = \mathcal{F}_T^w.$$

Az \mathcal{F} filtráció a feladat megfogalmazása szerint a w által generált filtráció, ezért

$$\int_A g d\mathbf{P} = 0, \quad A \in \mathcal{F}_T.$$

A g függvény \mathcal{F}_T -mérhető, következésképpen $g \stackrel{m.m.}{=} 0$, ugyanis ha például az $A \doteq \{g > 0\}$ halmaz mértéke pozitív lenne, akkor

$$\int_A g d\mathbf{P} > 0$$

lenne, ami lehetetlen, ugyanis $A \in \mathcal{F}_T$.

Theorem (Itô)

Legyen w Wiener-folyamat és jelölje \mathcal{F} a w által generált filtrációt. Ha

$$\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbf{P}),$$

akkor található, mégpedig egyetlen olyan $X \in \mathcal{L}^2(w)$, amelyre

$$\xi = \mathbf{E}(\xi) + \int_0^T X dw.$$

A bizonyítás kulcsa a következő Itô-izometria:

Theorem

Tetszőleges M folytonos lokális martingál esetén ha $X \in \mathcal{L}^2(M)$, akkor az $X \bullet M \in \mathcal{H}^2$, vagyis $X \bullet M$ négyzetesen integrálható martingál és

$$\begin{aligned} \|X \bullet M\|_{\mathcal{H}^2}^2 &\stackrel{\circ}{=} \mathbf{E} \left((X \bullet M)^2(T) \right) = \mathbf{E} \left([X \bullet M](T) \right) = \\ &= \mathbf{E} \left((X^2 \bullet [M])(T) \right) \stackrel{\circ}{=} \|X\|_M^2. \end{aligned}$$

Az izometria alkalmazása

Legyen \mathcal{U} az olyan ξ változók halmaza, amelyekre a tételben szereplő előállítás valamilyen $X \in \mathcal{L}^2(w)$ folyamattal lehetséges. Az \mathcal{U} triviálisan lineáris tér. Ha $\xi \in \mathcal{U}$, akkor az előállítás két oldalát négyzetre emelve az Itô-izometria alapján

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\xi^2) &= (\mathbf{E}(\xi))^2 + 2\mathbf{E}(\xi) \cdot \mathbf{E}\left(\int_0^T X dw\right) + \mathbf{E}\left(\left(\int_0^T X dw\right)^2\right) = \\ &= (\mathbf{E}(\xi))^2 + \mathbf{E}\left(\left(\int_0^T X dw\right)^2\right) = (\mathbf{E}(\xi))^2 + \|(X \bullet w)(T)\|_2^2 \doteq \\ &\doteq (\mathbf{E}(\xi))^2 + \|X \bullet w\|_{\mathcal{H}^2}^2 = (\mathbf{E}(\xi))^2 + \|X\|_w^2, \end{aligned}$$

ugyanis a feltétel szerint $X \in \mathcal{L}^2(w)$, így az $X \bullet w$ négyzetesen integrálható martingál, tehát

$$\mathbf{E}((X \bullet w)(T)) = \mathbf{E}((X \bullet w)(0)) = 0.$$

Az \mathcal{U} zárt, ugyanis ha $(\xi_n) \subseteq \mathcal{U} \subseteq L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbf{P})$ és $\xi_n \rightarrow \xi_\infty$, akkor $\mathbf{E}(\xi_n) \rightarrow \mathbf{E}(\xi_\infty)$ és ezért a (ξ_n) , illetve az $(\mathbf{E}(\xi_n))$ Cauchy-sorozatok. Így a megfelelő (X_n) is Cauchy-sorozat az $\mathcal{L}^2(w)$ térben. Mivel az $\mathcal{L}^2(w)$, miként minden L^2 -tér, teljes, ezért az (X_n) sorozatnak van $X_\infty \in \mathcal{L}^2(w)$ határértéke, természetesen az $\mathcal{L}^2(w)$ -ben definiált konvergencia szerint. Ugyancsak az Itô-izometria szerint az $L^2(\Omega)$ térben

$$\int_0^T X_n dw \rightarrow \int_0^T X_\infty dw,$$

ezért az előállítás teljesül a ξ_∞ határértékre is.

Egy sűrű részhalmaz megadása

Jelölje λ a Lebesgue-mértéket. Megmutatjuk, hogy az \mathcal{U} tartalmazza a

$$\xi \doteq \mathcal{E}(h \bullet w)(T) \doteq \exp\left(h \bullet w - \frac{1}{2}h^2 \bullet \lambda\right)(T)$$

alakú változókat, ahol h egy lépcsős függvény. Természetesen $h^2 \bullet \lambda$ értelemszerűen a h^2 integrálfüggvénye a λ Lebesgue-mérték szerint.

Az Itô-formula alapján tetszőleges M folytonos szemimartingálra ha

$$\mathcal{E}(M) \doteq \exp\left(M - \frac{1}{2}[M]\right),$$

akkor

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(M) - \mathcal{E}(M)(0) &= \\ &= \mathcal{E}(M) \bullet (M - 1/2[M]) + \frac{1}{2}\mathcal{E}(M) \bullet [M - 1/2[M]] = \\ &= \mathcal{E}(M) \bullet (M - 1/2[M]) + \frac{1}{2}\mathcal{E}(M) \bullet [M] = \\ &= \mathcal{E}(M) \bullet M.\end{aligned}$$

Így ha az M lokális martingál, akkor az $\mathcal{E}(M)$ mindig lokális martingál.

Ha $M \stackrel{\circ}{=} h \bullet w$, akkor

$$\mathcal{E}(M) \bullet M = \mathcal{E}(M) \bullet (h \bullet w) = (\mathcal{E}(M) h) \bullet w,$$

így

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}(M)(0) + (\mathcal{E}(M) h) \bullet w.$$

Elegendő belátni, hogy tetszőleges lépcsős h esetén a $[0, T]$ szakaszon

$$h\mathcal{E}(M) = h \exp\left(h \bullet w - \frac{1}{2}h^2 \bullet \lambda\right) \in \mathcal{L}^2(w),$$

ugyanis ekkor az $\mathcal{E}(M)$ valódi martingál, így, felhasználva, hogy az \mathcal{F}_0 a triviális σ -algebra

$$\mathbf{E}(\mathcal{E}(M)(T)) = \mathbf{E}(\mathcal{E}(M)(0)) = \mathcal{E}(M)(0).$$

Mivel a h lépcsős és determinisztikus, ezért felhasználva, hogy a w független növekményű

$$(h \bullet w)(s) = \sum_{t_i \leq s} \lambda_i \Delta w(t_i \wedge s) = N \left(0, \sqrt{\int_0^s h^2(u) du} \right).$$

$$\begin{aligned}\|h\mathcal{E}(M)\|_w^2 &= \mathbf{E}\left(\int_0^T (h \exp((h \bullet w) - \frac{1}{2}(h^2 \bullet \lambda)))^2(s) ds\right) = \\ &= \int_0^T \mathbf{E}\left(\left(h \exp\left(h \bullet w - \frac{1}{2}h^2 \bullet \lambda\right)\right)^2(s)\right) ds = \\ &= \int_0^T h^2(s) \exp\left(-\left(\int_0^s h^2(u) du\right)\right) \cdot \mathbf{E}\left(\exp\left((h \bullet w)(s)\right)^2\right) ds = \\ &= \int_0^T h^2(s) \exp\left(-\int_0^s h^2(u) du\right) \cdot \mathbf{E}\left(\exp\left(2N\left(0, \sqrt{\int_0^s h^2(u) du}\right)\right)\right) ds = \\ &= \int_0^T h^2(s) \exp\left(-\int_0^s h^2(u) du\right) \exp\left(2 \int_0^s h^2(u) du\right) ds = \\ &= \int_0^T h^2(s) \exp\left(\int_0^s h^2(u) du\right) ds = \exp\left(\int_0^T h^2(s) ds\right) - 1 < \infty.\end{aligned}$$

Következésképpen, miként állítottuk, a $[0, T]$ szakaszon

$$h\mathcal{E}(M) \in \mathcal{L}^2(w).$$

Így az $\mathcal{E}(h \bullet w)(T)$ alakú változókra teljesül a tétel, vagyis minden h lépcsős függvényre $\mathcal{E}(h \bullet w)(T) \in \mathcal{U}$. Ha \mathcal{F} a Wiener-folyamat által generált filtráció, akkor az $\mathcal{E}(h \bullet w)(T)$ alakú változók által generált lineáris tér sűrű az $L^2(\mathcal{F}_T)$ térben, az \mathcal{U} zárt lineáris tér, így $\mathcal{U} = L^2(\mathcal{F}_T)$.

Az egyértelműség bizonyítása

Az egyértelműség igazolása céljából tegyük fel, hogy

$$\xi = \mathbf{E}(\xi) + \int_0^T X_1 dw = \mathbf{E}(\xi) + \int_0^T X_2 dw,$$

vagyis

$$\int_0^T X_1 dw - \int_0^T X_2 dw = 0.$$

Az Itô-izometria felhasználásával

$$0 = \mathbf{E} \left(\left(\int_0^T X_1 - X_2 dw \right)^2 \right) = \mathbf{E} \left(\int_0^T (X_1 - X_2)^2 d\lambda \right).$$

Definíció szerint az $\mathcal{L}^2(w)$ az $(\mathbb{R}_+ \times \Omega, \mathcal{R}, \alpha_w)$, ahol $\alpha_w \doteq \lambda \times \mathbf{P}$ a Wiener-folyamathoz tartozó Doléans-mérték, szerint ekvivalens folyamatokból áll, így $X_1 = X_2$ vagyis az α_w szerint majdnem mindenhol megegyeznek.

Corollary

Az Itô-féle reprezentációs tételben a konstans egyértelmű, vagyis ha előírjuk, hogy $X \in \mathcal{L}^2(w)$, akkor a $\lambda = \mathbf{E}(\xi)$ az egyetlen olyan konstans, amelyre

$$\xi = \lambda + \int_0^T X dw.$$

Ha $X \in \mathcal{L}^2(w)$, akkor a sztochasztikus integrál valódi martingál és ezért a várható értéke nulla. Ebből következően $\lambda = \mathbf{E}(\xi)$.

Definition

A folytonos trajektóriájú és adaptált folyamatok mint kétváltozós függvények által az $\mathbb{R}_+ \times \Omega$ téren generált σ -algebrára mérhető folyamatokat előrejelezhetőnek mondjuk.

A folytonos függvények által generált σ -algebra éppen a számegeyenes Borel-halmazai. Világos hogy ezért minden determinisztikus Borel-mérhető függvény, mint folyamat, előrejelezhető.

Example

A balról folytonos, adaptált folyamatok előrejelezhetőek.

Legyen $(t_k^{(n)})$ egy $[0, T]$ szakasz infinitezimális felbontássorozata. Ha (X_n) trajektóriái a $(t_{k-1}^{(n)}, X(t_{k-1}^{(n)}))$ és $(t_k^{(n)}, X(t_k^{(n)}))$ pontokra támaszkodó lineáris törtfüggvények, akkor az X_n adaptált és folytonos. Az X balról való folytonossága miatt $X_n \rightarrow X$, így az X előrejelezhető. Megmutatható, hogy a Poisson-folyamat nem előrejelezhető.

Theorem

Az Itô-féle reprezentációban szereplő X folyamat választható előrejelezhetőnek.

A $h\mathcal{E} (h \bullet w)$ kifejezés előrejelezhető, ugyanis az $\mathcal{E} (h \bullet M)$ folyamat folytonos, a h pedig determinisztikus lépcsős függvény és így triviálisan előrejelezhető. Az általános eset következik abból, hogy az $\mathcal{L}^2 (w)$ azon altere, amely tartalmaz előrejelezhető reprezentánst zárt. Valóban, ha az (X_n) osztályok mindegyike tartalmaz egy \tilde{X}_n előrejelezhető reprezentánst és $X_n \rightarrow X_\infty$ az \mathcal{L}^2 térben, akkor van olyan részsorozat, hogy $\tilde{X}_n \rightarrow X$ majdnem mindenhol a Doléans-mérték szerint. De akkor az $\tilde{X}_\infty \doteq \liminf_n \tilde{X}_n$ előrejelezhető, és így az \tilde{X}_∞ az X_∞ egy előrejelezhető reprezentánsa.

Az Itô és a Dudley integrálrepresentációs tételek közötti alapvető eltérés, hogy az Itô-féle tételben az előállítás egyértelmű. Ez kulcs szerepet játszik a következő állításban.

Theorem

Legyen w Wiener-folyamat. Ha \mathcal{F} a w által generált filtráció, akkor tetszőleges M \mathcal{F} -lokális martingálra

$$M = M(0) + X \bullet w,$$

ahol $X \in \mathcal{L}_{loc}^2(w)$. Ha $M \in \mathcal{H}^2$, akkor $X \in \mathcal{L}^2(w)$. A reprezentáló X folyamat választható előrejelezhetőnek.

Ha $M \in \mathcal{H}^2$, akkor $M(\infty) \in L^2(\Omega)$ és

$$M(t) = \mathbf{E}(M(\infty) \mid \mathcal{F}_t).$$

Az Itô-féle integrálreprezentációs tétel szerint $M(\infty) = M(0) + \int_0^\infty Xdw$, ahol $X \in \mathcal{L}^2(w)$. Így

$$\begin{aligned} M(t) &= \mathbf{E}(M(\infty) \mid \mathcal{F}_t) = \mathbf{E}\left(\mathbf{E}(M(0)) + \int_0^\infty Xdw \mid \mathcal{F}_t\right) = \\ &= \mathbf{E}(M(0)) + \int_0^t Xdw, \end{aligned}$$

ugyanis mivel $X \in \mathcal{L}^2(w)$ ezért az $X \bullet w \in \mathcal{H}^2$ integrálfüggvény martingál. Megjegyezzük, hogy az X az α_w Doléans-mérték erejéig egyértelmű.

Ilyenkor tehát az állítás teljesül. Vegyük észre, hogy elvileg csak minden t időpontra majdnem mindenhol értelemben azonos a két oldal, de mivel mind a két oldalon jobbról reguláris folyamatok vannak a nullmértékű halmazok egyetlen nullmértékű halmazba egyesíthetőek. A későbbiek miatt hangsúlyozni kell, hogy az M az előállítás miatt rendelkezik folytonos verzióval.

Legyen $M(\infty) \in L^1(\Omega)$. Mivel a majorált konvergencia tétel miatt a korlátos függvények sűrűek az $L^1(\Omega)$ -ban, ezért $L^2(\Omega)$ sűrű az $L^1(\Omega)$ térben, így van olyan $\xi_n \in L^2(\Omega)$ sorozat, amelyre $\xi_n \rightarrow M(\infty)$ az $L^1(\Omega)$ konvergenciában. Tekintsük az

$$M_n(t) \doteq \mathbf{E}(\xi_n \mid \mathcal{F}_t)$$

martingálokat. A Doob-egyenlőtlenség miatt

$$\mathbf{P}\left(\sup_t |M_n(t) - M(t)| > \lambda\right) \leq \frac{\|M_n(\infty) - M(\infty)\|_1}{\lambda}.$$

Mivel $\|M_n(\infty) - M(\infty)\|_1 \rightarrow 0$, ezért valószínűségben

$$\sup_t |M_n(t) - M(t)| \rightarrow 0.$$

Mivel minden sztochasztikusan konvergens sorozatnak van majdnem mindenhol konvergens részsorozata, ezért részsorozatra áttérve feltehető, hogy a konvergencia majdnem mindenhol értelemben is teljesül, vagyis az egyenletes konvergencia topológiában az (M_n) trajektóriái egy nulla valószínűségű halmaztól eltekintve az M -hez konvergálnak. Miként a bizonyítás előző pontjában megjegyeztük M_n -ről feltehető, hogy folytonos, és az egyenletes konvergenciából következően az M is folytonos.

Lokális martingálok előállítása

Ha M lokális martingál, akkor létezik korlátos megállási időkből álló (τ_n) lokalizációs sorozat. Így az M^{τ_n} megállított martingálokra feltehető, hogy $M^{\tau_n}(\infty) \in L^1(\Omega)$. Így az M^{τ_n} folytonos minden n -re. Ebből következően az M is folytonos. Így feltehető, hogy a lokalizált folyamatok korlátosak, vagyis hogy az M^{τ_n} folyamatok \mathcal{H}^2 -ben vannak, vagyis teljesül rájuk az állítás. Ennek megfelelően

$$M^{\tau_n} = M^{\tau_n}(0) + X_n \bullet w \stackrel{\circ}{=} M(0) \chi(\tau_n > 0) + X_n \bullet w.$$

Ugyanakkor

$$\begin{aligned} M^{\tau_{n-1}} &= (M^{\tau_n})^{\tau_{n-1}} = (M(0) \chi(\tau_n > 0) + X_n \bullet w)^{\tau_{n-1}} = \\ &= M(0) \chi(\tau_{n-1} > 0) + (X_n \bullet w)^{\tau_{n-1}} = \\ &= M(0) \chi(\tau_{n-1} > 0) + X_n \chi([0, \tau_{n-1}]) \bullet w. \end{aligned}$$

Ez előállítás egyértelműsége miatt $X_{n-1} \stackrel{m.m.}{=} X_n \chi([0, \tau_{n-1}])$, és az X_n -ek „összeragaszthatók” egyetlen $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^2$ folyamattá.

Corollary

Legyen w Wiener-folyamat és legyen \mathcal{F} a w által generált filtráció. Ha L lokális martingál az \mathcal{F} filtrációra nézve, akkor az L folytonos.

Az előző állítás szerint az \mathcal{F} szerinti lokális martingálok sztochasztikus integrálként írhatók fel a w folyamat szerint, így folytonosak.

A folytonos filtráció fontos következménye, hogy ha M egy martingál, akkor tetszőleges t időpontban

$$\lim_{s \searrow t} M(s) = M(t) \stackrel{m.m.}{=} \lim_{s \nearrow t} M(s).$$

Az első egyenlőség azért igaz, mert a martingálokat eleve jobbról regularizálva definiáljuk. A második egyenlőség a Lévy-féle konvergencia tétel következménye, amely szerint

$$\begin{aligned} \lim_{s \nearrow t} M(s) &\stackrel{m.m.}{=} \lim_{s \nearrow t} \mathbf{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_s) \stackrel{m.m.}{=} \mathbf{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_{t-}) = \\ &= \mathbf{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_t) \stackrel{m.m.}{=} M(t). \end{aligned}$$

Mivel az egyenlőségek minden lépésben csak majdnem mindenhol teljesülnek, ezért a filtráció folytonossága csak azt implikálja, hogy minden t időpontban a trajektóriák közül majdnem mindegyik folytonos, vagyis egy adott t időpontban az ugrás valószínűség nulla. Ugyanakkor a „nullmértékű halmazok bosszújának” tipikus esetéről van szó. Mivel a lehetséges időpontok halmaza nem megszámlálható, nem tudjuk igazolni, hogy majdnem mindegyik trajektória folytonos. A tipikus példa a Poisson-folyamat, amely minden időpontban nulla valószínűséggel ugrik, de a trajektóriái egy valószínűséggel nem folytonosak.

Example

Az állítás nem igaz minden folytonos filtrációra nézve. (A példa azért fontos, mert a Sztochasztikus analízis könyvben az idevágó állítás hibás.)

Legyen X egy Poisson-folyamat. Az X által generált filtrációról könnyen igazolható, hogy jobbról folytonos. (Elegendő felhasználni, hogy a trajektóriák minden t időpontban egy ideig konstansok.) Ha az \mathcal{F}^X -et kiegészítjük a nullmértékű halmazokkal, akkor az így kapott kibővített filtráció balról is folytonos lesz, ugyanis ha $t_n \nearrow t$, akkor majdnem minden kimenetelre $X(t_n) \nearrow X(t)$, ugyanis minden t időpontban az ugrás valószínűsége nulla, vagyis minden t időpontban a trajektóriák majdnem minden kimenetelre folytonosak. Így minden t -re az $X(t)$ mérhető az \mathcal{F}_{t-} σ -algebrára nézve, így $\mathcal{F}_{t-} = \mathcal{F}_t$. Ugyanakkor az \mathcal{F} hordozza, a nem folytonos trajektóriákkal rendelkező X Poisson-folyamatot.

Legyen $((w_1, w_2), \mathcal{G})$ független koordinátákból álló kétdimenziós Wiener-folyamat. Legyen $X \doteq w_1 \bullet w_2$, és \mathcal{F} legyen az X által generált filtráció. Evidens módon $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{G}_t$, és az $[X]$ kvadratikus variáció \mathcal{F} -adaptált. Mivel

$$[X](t) = \int_0^t w_1^2 d[w_2] = \int_0^t w_1^2(s) ds,$$

ezért a w_1^2 éppen az $[X]$ deriváltja, tehát a w_1^2 szintén \mathcal{F} -adaptált, következésképpen az Itô-formula szerint a

$$Z(t) \doteq w_1 \bullet w_1(t) = \frac{1}{2} (w_1^2 - [w_1])(t)$$

is \mathcal{F} -adaptált. A Z \mathcal{F} -martingál, ugyanis ha $s < t$, akkor, felhasználva, hogy a $Z \doteq w_1^2 - [w_1]$ \mathcal{G} -martingál

$$\mathbf{E}(Z(t) \mid \mathcal{F}_s) = \mathbf{E}(\mathbf{E}(Z(t) \mid \mathcal{G}_s) \mid \mathcal{F}_s) = \mathbf{E}(Z(s) \mid \mathcal{F}_s) = Z(s).$$

Mivel analóg módon

$$\mathbf{E}(X(t) | \mathcal{F}_s) = \mathbf{E}(\mathbf{E}(X(t) | \mathcal{G}_s) | \mathcal{F}_s) = \mathbf{E}(X(s) | \mathcal{F}_s) = X(s),$$

ezért az X is \mathcal{F} -martingál. Tegyük fel, hogy az (X, \mathcal{F}) párra teljesül a reprezentációs tulajdonság és legyen

$$Z = Y \bullet X \stackrel{\circ}{=} Y \bullet (w_1 \bullet w_2) = Yw_1 \bullet w_2.$$

A w_1 és w_2 függetlenek, ezért $[w_1, w_2] = 0$, és így

$$\begin{aligned} 0 &< [Z \bullet Z] = [w_1 \bullet w_1, Y \bullet X] = [w_1 \bullet w_1, Yw_1 \bullet w_2] = \\ &= Yw_1^2 \bullet [w_1, w_2] = 0, \end{aligned}$$

lenne, ami lehetetlen.