

# Wiener-folyamat

Medvegyev Péter

2008

# A Wiener-folyamat definíciója

## Definition

A  $\{w(t, \omega)\}_{t \geq 0}$  folyamatot Wiener-folyamatnak mondjuk, ha teljesíti az alábbi négy feltételt:

1.  $w(0) \equiv 0$ ,
2. a  $w$  növekményei függetlenek,
3. tetszőleges  $0 \leq s < t$  értékekre a  $w(t) - w(s) \cong N(0, \sqrt{t-s})$ , vagyis a  $w(t) - w(s)$  változó sűrűségfüggvénye

$$g_{t-s}(x) \stackrel{\circ}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \exp\left(\frac{-x^2}{2(t-s)}\right).$$

4. A  $w$  folytonos abban az értelemben, hogy minden  $\omega$  kimenetelre a  $w(\omega)$  trajektória folytonos.

# Paley–Wiener–Zygmund tétele

## Theorem

*Majdnem minden  $\omega$  kimenetelre a  $w(\omega)$  trajektória egyetlen időpontban sem deriválható.*

Elegendő megmutatni, hogy majdnem minden  $\omega$ -ra a  $w(t, \omega)$ -nak egyetlen  $t$  időpontban sem létezik a jobb oldali deriváltja. Ha  $f$  tetszőleges valós függvény, akkor minden  $t$  pontban tekinthetjük a következő deriváltszámokat:

$$D^+ f(t) = \limsup_{h \searrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}, \quad D_+ f(t) = \liminf_{h \searrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

Világos, hogy az  $f$  függvény a  $t$  pontban pontosan akkor deriválható jobbról, ha a deriváltszámok végesek és megegyeznek.

# Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás I

Az egyszerűbb jelölés véget legyen  $[a, b] = [0, 1]$ . Legyenek  $j \geq 1$  és  $k \geq 1$  egész számok, és tekintsük az

$$\begin{aligned} A_{jk} &\stackrel{\circ}{=} \bigcup_{t \in [0,1]} \bigcap_{h \in (0,1/k]} \left\{ \left| \frac{w(t+h) - w(t)}{h} \right| \leq j \right\} = \\ &= \bigcup_{t \in [0,1]} \bigcap_{h \in [0,1/k]} \{ |w(t+h) - w(t)| \leq hj \} \end{aligned}$$

halmazokat. Világos, hogy a  $B \stackrel{\circ}{=} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{jk}$  halmaz pontosan azokból az  $w$  kimenetelekből áll, amelyekhez létezik  $t$  időpont, hogy

$$-\infty < D_+ w(t, \omega) \quad \text{és} \quad D^+ w(t, \omega) < +\infty.$$

A tételt belátjuk, ha megmutatjuk, hogy  $\mathbf{P}(B) = 0$ .

## Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás II

Ehhez viszont elegendő belátni, hogy minden  $k$  és  $j$  természetes számra  $\mathbf{P}(A_{jk}) = 0$ . Rögzítsük a  $j$  és a  $k$  számokat. Legyen  $\omega \in A_{jk}$ , és legyen  $t$  az  $\omega$ -hoz tartozó egyik időpont. A definíció alapján, ha  $0 < h \leq 1/k$ , akkor

$$\frac{|w(t+h, \omega) - w(t, \omega)|}{h} \leq j,$$

vagy ami ugyanaz

$$|w(t+h, \omega) - w(t, \omega)| \leq hj.$$

## Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás III

Legyen  $n \geq 4k$ , és osszuk fel a  $[0, 1]$  intervallumot  $n$  egyenlő részre. Legyen  $1 \leq i \leq n$  olyan, hogy  $t \in [(i-1)/n, i/n]$ .

Tekintsük a következő három becslés:

Először

$$\begin{aligned} \left| w\left(\frac{i+1}{n}\right) - w\left(\frac{i}{n}\right) \right| &\leq \left| w\left(\frac{i+1}{n}\right) - w(t) \right| + \left| w\left(\frac{i}{n}\right) - w(t) \right| \\ &\leq \frac{2j}{n} + \frac{j}{n} \end{aligned}$$

hiszen mivel

$$t \in \left[ \frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \quad \text{és} \quad \frac{4}{n} \leq \frac{1}{k}$$

ezért

$$0 < \frac{i+1}{n} - t = \left( \frac{i}{n} - t \right) + \frac{1}{n} \leq \frac{2}{n} = h \leq \frac{1}{k},$$

$$0 < \frac{i}{n} - t \leq \frac{1}{n} = h \leq \frac{1}{k}.$$

# Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás IV

Másodszor

$$\begin{aligned} \left| w\left(\frac{i+2}{n}\right) - w\left(\frac{i+1}{n}\right) \right| &\leq \left| w\left(\frac{i+2}{n}\right) - w(t) \right| + \\ &+ \left| w\left(\frac{i+1}{n}\right) - w(t) \right| \leq \frac{3j}{n} + \frac{2j}{n} \end{aligned}$$

hiszen ismételten miként fent

$$\begin{aligned} 0 < \frac{i+2}{n} - t &= \left(\frac{i}{n} - t\right) + \frac{2}{n} \leq \frac{3}{n} = h \leq \frac{1}{k}, \\ 0 < \frac{i+1}{n} - t &\leq \frac{2}{n} = h \leq \frac{1}{k} \end{aligned}$$

# Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás V

Harmadszor

$$\begin{aligned} \left| w\left(\frac{i+3}{n}\right) - w\left(\frac{i+2}{n}\right) \right| &\leq \left| w\left(\frac{i+3}{n}\right) - w(t) \right| + \\ &+ \left| w\left(\frac{i+2}{n}\right) - w(t) \right| \leq \frac{4j}{n} + \frac{3j}{n} \end{aligned}$$

hiszen továbbra

$$\begin{aligned} 0 < \frac{i+3}{n} - t &= \frac{i}{n} - t + \frac{3}{n} \leq \frac{4}{n} = h \leq \frac{1}{k}, \\ 0 < \frac{i+2}{n} - t &\leq \frac{3}{n} = h \leq \frac{1}{k}. \end{aligned}$$



# Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás VI

Jelölje  $C_{in}$  a

$$\bigcap_{m=1}^3 \left\{ \omega : \left| w \left( \frac{i+m}{n}, \omega \right) - w \left( \frac{i+m-1}{n}, \omega \right) \right| \leq \frac{2m+1}{n} j \right\}$$

halmazt. Ha  $\omega \in A_{jk}$  akkor az  $\omega$ -hoz tartozó valamelyik  $t$  időpontra alkalmas  $i$  indexre  $t \in [(i-1)/n, i/n]$  ezért, ha  $n \geq 4k$  akkor az imént belátott három egyenlőtlenségből

$$A_{jk} \subseteq \bigcup_{i=1}^n C_{in}.$$

Elegendő tehát megmutatni, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left( \bigcup_{i=1}^n C_{in} \right) = 0.$$

## Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás VII

Becsüljük meg a  $C_{in}$  esemény valószínűségét. A Wiener–folyamat definíciója alapján a

$$\xi_m \stackrel{\circ}{=} \sqrt{n} \left( w \left( \frac{i+m}{n} \right) - w \left( \frac{i+m-1}{n} \right) \right)$$

változó normális eloszlású nulla várható értékkel és 1 szórással. Az  $\exp(-x^2/2)$  függvény a maximumát a 0 pontban veszi fel, és  $\exp(0) = 1$ , ezért

$$\mathbf{P}(|\xi_m| \leq \alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\alpha}^{\alpha} \exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right) dx \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\alpha \leq \alpha.$$

## Paley–Wiener–Zygmund tétele Bizonyítás VIII

Felhasználva, hogy a Wiener-folyamat független növekményű,  
minden  $i$  indexre

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(C_{in}) = \\ &= \mathbf{P}\left(\bigcap_{m=1}^3 \left\{ \sqrt{n} \left| w\left(\frac{i+m}{n}\right) - w\left(\frac{i+m-1}{n}\right) \right| \leq \frac{2m+1}{\sqrt{n}} j \right\}\right) = \\ &= \prod_{m=1}^3 \mathbf{P}\left(\left\{ \sqrt{n} \left| w\left(\frac{i+m}{n}\right) - w\left(\frac{i+m-1}{n}\right) \right| \leq \frac{2m+1}{\sqrt{n}} j \right\}\right) \leq \\ & \leq \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot j^3}{n^{3/2}}. \end{aligned}$$

Ez alapján

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^n C_{in}\right) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(C_{in}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{105j^3}{n^{3/2}} = 0.$$

# Wiener-folyamat a végtelenben

## Theorem

Ha  $w$  Wiener-folyamat, akkor majdnem minden kimenetelre

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} w(t) = \infty, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} w(t) = -\infty.$$

Mivel a  $t \mapsto w(t+s) - w(s)$  Wiener-folyamat minden  $s$ -re elegendő belátni, hogy

$$\eta \stackrel{\circ}{=} \sup_{t \geq 0} w(t) \stackrel{a.s.}{=} \infty. \quad (1)$$

Ha  $c \neq 0$  akkor a  $w_c \stackrel{\circ}{=} cw(t/c^2)$  szintén Wiener-folyamat. Elegendő a szuprémumot a racionális időpontokban venni, így az  $\eta$  mérhető. Nyilván

$$\sup_t w_c(t) \stackrel{\circ}{=} \sup_t c \cdot w\left(\frac{t}{c^2}\right) = c \cdot \eta.$$

Így az  $\eta$  majdnem mindenhol vagy 0 vagy  $\infty$ . A  $w(t+1) - w(1)$  szintén Wiener-folyamat, így  $\sup_{t \geq 1} (w(t) - w(1))$  szintén 0 vagy

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}(\eta = 0) &\stackrel{\circ}{=} \mathbf{P}\left(\sup_{t \geq 0} w(t) = 0\right) \leq \mathbf{P}\left(\sup_{t \geq 1} w(t) \leq 0\right) = \\
&= \mathbf{P}\left(w(1) + \sup_{t \geq 0} (w(t+1) - w(1)) \leq 0\right) = \\
&= \mathbf{P}\left(w(1) \leq 0, \sup_{t \geq 0} (w(t+1) - w(1)) = 0\right)
\end{aligned}$$

ugyanis a végtelen nem fordulhat elő, hiszen akkor az előző szuprémum is végtelen. A két esemény független, így

$$p \stackrel{\circ}{=} \mathbf{P}(\eta = 0) \leq \mathbf{P}(w(1) \leq 0) \cdot \mathbf{P}\left(\sup_{t \geq 0} \{w(t+1) - w(1)\} = 0\right) = \frac{1}{2}$$

Így  $p = 0$ .

## A Wiener-folyamatok konstrukciója

A Wiener-folyamatot először a  $[0, 1]$  intervallumon állítjuk elő, később a független és stacionárius növekmény feltételével a konstrukciót kiterjesztjük az  $\mathbb{R}_+$  félegyenesre. Legyen  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$  olyan mező, amelyen létezik megszámlálható sok  $(\xi_n)$  független, normális eloszlású valószínűségi változó. Jelölje  $H \subseteq L^2(\Omega)$  a változók által kifeszített zárt  $L^2$  alteret. Mivel független normális eloszlású változók lineáris kombinációja újra normális eloszlású, valamint mivel az  $L^2$ -konvergenciából következik a gyenge konvergencia, ezért normális eloszlású változók sorozatának  $L^2$ -határértéke normális, így a  $H$  elemeinek tetszőleges véges részhalmazának együttes eloszlása normális.

## A folyamat konstruálása izometriával

Tekintsük az  $L^2 [0, 1]$  Hilbert-teret. Legyen  $(e_n)$  az  $L^2 [0, 1]$  tetszőleges ortonormált bázisa. Tekintsük az  $e_n \longleftrightarrow \tilde{\zeta}_n$  megfeleltetés által meghatározott

$$T : \sum_k a_k e_k \longmapsto \sum_k a_k \tilde{\zeta}_k$$

izomorfiát. Tetszőleges  $t$ -re  $\chi [0, t] \in L^2 [0, 1]$ , ezért értelmes a

$$\begin{aligned} w(t) &\stackrel{\circ}{=} T(\chi [0, t]) = T\left(\sum_k a_k(t) e_k\right) = \sum_k a_k(t) T(e_k) = \\ &= \sum_k a_k(t) \tilde{\zeta}_k = \sum_k (\chi [0, t], e_k) \cdot \tilde{\zeta}_k = \sum_k \left(\int_0^t e_k d\lambda\right) \cdot \tilde{\zeta}_k \end{aligned}$$

változó.

## A kovariencia kiszámolása

Evidens módon a Parseval-formula alapján

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(w(t)w(s)) &= (T(\chi[0,t]), T(\chi[0,s])) = \sum_l \sum_k a_k(t) a_l(s) (\xi_k, \xi_l) \\ &= \sum_k a_k(t) a_k(s) = (\chi[0,t], \chi[0,s]) = \\ &= \int_0^1 \chi[0,t] \chi[0,s] d\lambda = \min(t, s),\end{aligned}$$

amiből könnyen látható, hogy a folytonosságtól eltekintve a  $w$  Wiener-folyamat. Például

$$\mathbf{D}^2(w(t)) = \mathbf{E}(w^2(t)) = t,$$

$$\mathbf{E}([w(t+h) - w(t)]w(t)) = t - t = 0,$$

vagyis a folyamat független növekményű, ugyanis normális eloszlású változók esetén a korrelálatlanságból következik a függetlenség.



# Haar-függvények

A kérdés csak az, hogy alkalmasan megválasztott ortonormált bázis esetén vajon a  $w(\omega)$  majdnem minden  $\omega$  kimenetelre folytonos-e? Az alkalmas ortonormált bázist a Haar-függvények szolgáltatják. Jelölje  $I(n)$  a 0 és  $2^n$  közötti páratlan számokat, vagyis legyen  $I(0) = \{1\}$ ,  $I(1) = \{1\}$ ,  $I(2) = \{1, 3\}$ , stb. Vagyis a  $[0, 1]$  szakaszt osszuk fel  $2^n$  részre és vegyük a résszakaszokat párossával. A  $[0, 1]$  intervallumon tekintsük a<sup>1</sup>

$$H_k^{(n)}(t) \doteq \begin{cases} +2^{(n-1)/2} & \text{ha } t \in [(k-1)/2^n, k/2^n) \\ -2^{(n-1)/2} & \text{ha } t \in [k/2^n, (k+1)/2^n) \\ 0 & \text{ha } t \notin [(k-1)/2^n, (k+1)/2^n) \end{cases}$$

Haar-féle függvényrendszert.

---

<sup>1</sup> $H_1^{(0)}(t) \doteq 1$ .

## A Haar-függvények teljes ortonormált rendszer

A Haar-függvények igen fontos tulajdonsága, hogy az  $L^2 [0, 1]$  teljes, ortonormált rendszerét alkotják. Az ortonormálttság közvetlen számolással egyszerűen ellenőrizhető. A teljességet a következő módon igazolhatjuk: Ha  $f$  merőleges az összes  $H_k^{(n)}$  függvényre, akkor az  $f$   $F(x) \doteq \int_0^x f(t) dt$  integrálfüggvényére  $F(1) - F(0) = (f, H_1^{(0)}) = 0$ , amiből  $F(1) = F(0) = 0$ . Hasonlóan  $0 = (f, H_1^{(1)}) = 2F(1/2) = 0$  stb., amiből  $F(k/2^n) = 0$ , vagyis  $F \equiv 0$ .

## A sátorfüggvények definiálása

Minden  $k \in I(n)$  ( $n, k$ ) párhoz tekintsük az

$$S_k^{(n)}(t) \doteq \int_0^t H_k^{(n)} d\lambda$$

sátorfüggvényt, amely a  $[0, (k-1)/2^n]$ , illetve a  $[(k+1)/2^n, 1]$  halmazokon nulla, és a  $[(k-1)/2^n, (k+1)/2^n]$  intervallumon pedig a gráfja a  $k/2^n$  pont mint középpont fölé emelt, és a két szomszédos páros számlálóval rendelkező  $n$ -ed rendű diadikus törtekre mint csúcspontokra támaszkodó  $2^{-(n+1)/2}$  magasságú, egyenlő szárú háromszög. Az imént vázolt konstrukciónak megfelelően legyen

$$w_n(t) \doteq \sum_{m=0}^n \sum_{k \in I(m)} S_k^{(m)}(t) \zeta_k^{(m)}.$$

Mivel az  $S_k^{(n)}(t)$  függvények folytonosak, a  $w_n(\omega)$  trajektória minden  $\omega$  kimenetelre folytonos.

## Egyenletes konvergencia

Megmutatjuk, hogy majdnem minden  $\omega$ -ra a  $(w_n(t, \omega))$  sorozat  $t$ -ben egyenletesen konvergens. Tekintsük a

$$b_n \stackrel{\circ}{=} \max_{k \in I(n)} \left| \tilde{\zeta}_k^{(n)} \right|$$

változót.  $\tilde{\zeta}_k^{(n)} \cong N(0, 1)$ , ezért ha  $x > 0$ , akkor

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \left( \left| \tilde{\zeta}_k^{(n)} \right| > x \right) &= 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty \exp \left( -\frac{u^2}{2} \right) du \leq \\ &\leq \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_x^\infty \frac{u}{x} \exp \left( -\frac{u^2}{2} \right) du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\exp(-x^2/2)}{x}, \end{aligned}$$

amiből

$$\mathbf{P}(b_n > n) = \mathbf{P} \left( \bigcup_{k \in I(n)} \left\{ \left| \tilde{\zeta}_k^{(n)} \right| > n \right\} \right) \leq 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\exp(-n^2/2)}{n}.$$

## Borel–Cantelli lemma

$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \exp(-n^2/2) / n < \infty$ , ezért a Borel–Cantelli-lemma alapján

$\mathbf{P} \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} \{b_n > n\} \right) = 0$ , vagyis majdnem minden  $\omega$ -ra, ha  $n \geq n_0(\omega)$ , akkor  $b_n(\omega) \leq n$ , amiből majdnem minden  $\omega$ -ra elég nagy  $n$  indextől, felhasználva, hogy az  $S_k^{(n)}$  függvények tartója diszkrét

$$\begin{aligned} |w_n(t, \omega) - w_{n-1}(t, \omega)| &= \left| \sum_{k \in I(n)} \xi_k^{(n)}(\omega) S_k^{(n)}(t) \right| \leq \\ &\leq n \sum_{k \in I(n)} S_k^{(n)}(t) \leq n 2^{-(n+1)/2}. \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} n 2^{-(n+1)/2} < \infty$ , ezért a  $(w_n(t, \omega))$  sorozat majdnem minden  $\omega$ -ra egyenletesen konvergens, és ezért a  $w(t, \omega)$  határérték a  $t$  időparaméter szerint folytonos.

## Kiterjesztés a számegyenesre

Hátra van a  $w$  kiterjesztése a  $[0, 1]$ -ről a  $[0, \infty)$ -re. Legyen  $w^{(n)}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) megszámlálható  $[0, 1]$ -en definiált olyan Wiener-folyamat, amelyekre minden  $t, s \in [0, 1]$  esetén ha  $m \neq k$  akkor  $w^{(m)}(t)$  és a  $w^{(k)}(s)$  változók függetlenek. Ilyen folyamatok léteznek, hiszen a kiindulási feltétel alapján az alapul vett  $\Omega$  valószínűségi mezőn létezik megszámlálható sok független normális eloszlású valószínűségi változó, amelyeket két dimenziós végtelen mátrixba rendezve megszámlálható sok Wiener-folyamatot kapunk. Mivel az egyes sorokban levő változók függetlenek, ezért mind a lineáris kombinációk mind a lineáris kombinációk határértékei függetlenek. Legyen  $w(t) \doteq w^{(1)}(t)$ , ha  $t \in [0, 1]$ , és legyen

$$w(t) \doteq w(n) + w^{(n+1)}(t - n), \quad \text{ha } t \in [n, n + 1].$$

Minden  $n$ -re  $w^{(n)}(0) = 0$ , ezért a  $w$  folytonos a  $[0, \infty)$  halmazon. Közvetlen ellenőrzéssel könnyen belátható, hogy a  $w$ -re teljesülnek a Wiener-folyamat tulajdonságai

# Véletlen időpontok, amelyek nem megállási idők

## Example

A nullába való utolsó visszatérés nem megállási idő.

Legyen  $a > 0$  és legyen  $w$  egy Wiener-folyamat. Legyen

$$\gamma_a \stackrel{\circ}{=} \sup \{0 \leq s \leq a : w(s) = 0\} = \inf \{s \geq 0 : w(a-s) = 0\}.$$

A  $\gamma_a$  nyilván  $\mathcal{F}_a$ -mérhető, így véletlen időpont. Mivel

$\mathbf{P}(w(a) = 0) = 0$  majdnem minden kimenetelre  $\gamma_a < a$ . Ha  $\gamma_a$  megállási idő lenne, akkor az erős Markov-tulajdonság miatt a

$$w^*(t) \stackrel{\circ}{=} w(t + \gamma_a) - w(\gamma_a)$$

szintén Wiener-folyamat lenne.

## A nullába való utolsó visszatérés

Ha  $w^*$  Wiener-folyamat, akkor a  $\tilde{w}(t) \doteq tw^*(1/t)$  megfordított folyamat szintén Wiener-folyamat. Mivel az egy-dimenziós Wiener-folyamatok egy valószínűséggel visszatérnek az origóba az erős Markov-tulajdonsággal könnyű belátni, hogy majdnem minden trajektóriára a  $\tilde{w}$  tetszőleges  $t$  után is visszatér az origóba. Így majdnem minden trajektóriára létezik olyan  $t_n \searrow 0$ , természetesen  $\omega$ -tól függő, sorozat, hogy  $t_n > 0$  és  $w^*(t_n) = 0$ . De ez lehetetlen, ugyanis a  $w^*$  nem nulla a  $(0, a - \gamma_a]$  szakaszon.



# Véletlen időpontok, amelyek nem megállási idők

## Example

A maximum időpontja nem megállási idő.

Legyen

$$\begin{aligned}\beta_a &\stackrel{\circ}{=} \max \{w(s) : 0 \leq s \leq a\}, \\ \rho_a &\stackrel{\circ}{=} \inf \{0 \leq s \leq a : w(s) = \beta_a\}.\end{aligned}$$

Mivel  $\mathbf{P}(w(a) - w(a/2) < 0) = 1/2$ , ezért  $\mathbf{P}(\rho_a < a) > 0$ .

## Véletlen időpontok, amelyek nem megállási idők

Ha  $\rho_a$  megállási idő lenne, akkor az erős Markov-tulajdonság miatt a

$$w^*(t) \stackrel{\circ}{=} w(t + \rho_a) - w(\rho_a)$$

szintén Wiener-folyamat lenne. Minden Wiener-folyamatra majdnem minden kimenetelre  $\limsup_{t \rightarrow \infty} w(t) = \infty$ . Ha ezt a  $\tilde{w}(t) \stackrel{\circ}{=} tw(1/t)$  megfordított folyamatra alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy minden Wiener-folyamat az origó közelében majdnem minden kimenetelre tetszőleges rövid időszakason felvesz pozitív értéket. Ez azonban a  $w^*$  esetén nem teljesül, ugyanis pozitív valószínűséggel a  $(0, a - \rho_a]$  szakasz nem üres és a  $w^*$  nem rendelkezik rajta pozitív értékkel.

# Négyzetesen integrálható martingálok

## Definition

Legyen  $p > 1$  és jelölje  $\mathcal{H}^p$  az olyan  $M$  martingálok osztályát, amelyekre

$$\sup_t \|M(t)\|_p < \infty.$$

A  $\mathcal{H}^2$  tér elemeit négyzetesen integrálható vagy  $L^2$ -martingáloknak szokás mondani.

# Energia-azonosság

## Theorem

Ha az  $M$  martingálra minden  $t$  időpontban az  $M(t)$  négyzetesen integrálható és  $s < t$ , akkor

$$\mathbf{E} \left( (M(t) - M(s))^2 \right) = \mathbf{E} (M^2(t)) - \mathbf{E} (M^2(s)).$$

A két oldal különbsége

$$\Delta \doteq 2 \cdot \mathbf{E} (M(s) (M(s) - M(t))).$$

A teljes várható érték tétel, a kiemelési szabály és a martingáltulajdonság miatt

$$\begin{aligned} \Delta &\doteq 2 \cdot \mathbf{E} (M(s) \cdot (M(s) - M(t))) = \\ &= 2 \cdot \mathbf{E} (M(s) \cdot \mathbf{E} (M(s) - M(t) \mid \mathcal{F}_s)) = \\ &= 2 \cdot \mathbf{E} (M(s) \cdot 0) = 0. \end{aligned}$$

# Négyzetesen integrálható martingálok struktúrája

## Theorem

Ha  $M \in \mathcal{H}^2$ , akkor létezik olyan  $M(\infty) \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_\infty, \mathbf{P})$ , hogy

$$M(t) = \mathbf{E}(M(\infty) \mid \mathcal{F}_t),$$

és  $L^2$ -konvergenciában

$$M(t) \rightarrow M(\infty).$$

Másképpen fogalmazva a  $\mathcal{H}^2$  martingálok lezárhatóak.

## Bizonyítás

Legyen  $t_n \nearrow \infty$  tetszőleges. Az energiaazonosság miatt az  $\left(\|M(t_n)\|_2^2\right) \doteq (\mathbf{E}(M^2(t_n)))$  monoton nő, a  $\mathcal{H}^2$  definíciója miatt korlátos, tehát van határértéke. Ugyancsak az energiaazonosság miatt, ha  $n > m$ , akkor

$$\|M(t_n) - M(t_m)\|_2^2 = \|M(t_n)\|_2^2 - \|M(t_m)\|_2^2,$$

így az  $(M(t_n))$  Cauchy-sorozat. Az  $L^2(\Omega)$  teljessége miatt az  $(M(t_n))$  sorozat  $L^2$ -konvergens. Különböző sorozatok összefésüléséből kapott sorozatok konvergensek, így az  $M(\infty)$  határérték, mint az  $L^2(\Omega)$ -tér eleme, egyértelmű. A martingáltulajdonság miatt, ha  $s \geq 0$ , akkor

$$M(t) = \mathbf{E}(M(t+s) \mid \mathcal{F}_t).$$

Ha az alaptér mértéke véges, akkor az  $L^2$ -konvergenciából következik az  $L^1$ -konvergencia, tehát ha  $s \rightarrow \infty$ , akkor

$$M(t) = \mathbf{E}\left(\lim_{s \rightarrow \infty} M(t+s) \mid \mathcal{F}_t\right) = \mathbf{E}(M(\infty) \mid \mathcal{F}_t).$$

# Első Doob-egyenlőtlenség (Kolmogorov-egyenlőtlenség)

## Theorem

Ha  $\lambda \geq 0$  és  $X = (X_k, \mathcal{F}_k)_{k=1}^n$  szubmartingál, akkor

$$\lambda \mathbf{P} \left( \max_{1 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda \right) \leq \mathbf{E}(|X_n|).$$

# Bizonyítás I

Legyen  $X$  szubmartingál és  $\lambda > 0$ .

$$A_1 \doteq \{X_1 \geq \lambda\}, \quad A_k \doteq \left\{ \max_{1 \leq i < k} X_i < \lambda \leq X_k \right\}, \quad A \doteq \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda \right\}$$

Megmutatjuk, hogy

$$\lambda \mathbf{P}(A) \doteq \lambda \mathbf{P} \left( \max_{1 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda \right) \leq \int_A X_n d\mathbf{P},$$

amiből az egyenlőtlenség következik, ugyanis

$$\int_A X_n d\mathbf{P} \leq \mathbf{E}(X_n^+) \leq \mathbf{E}(|X_n|).$$



## Bizonyítás II

Evidens módon az  $A_k$  halmazok diszjunktak és  $A = \cup_k A_k$ . Vegyük észre, hogy  $A_k \in \mathcal{F}_k$ , következésképpen a szubmartingál tulajdonság felhasználásával

$$\begin{aligned}\lambda \mathbf{P}(A) &= \lambda \sum_{k=1}^n \mathbf{P}(A_k) \leq \sum_{k=1}^n \int_{A_k} X_k d\mathbf{P} \leq \sum_{k=1}^n \int_{A_k} \mathbf{E}(X_n | \mathcal{F}_k) d\mathbf{P} = \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{A_k} X_n d\mathbf{P} = \int_A X_n d\mathbf{P}.\end{aligned}$$

## Második Doob-egyenlőtlenség

### Theorem

Ha  $X = (X_k, \mathcal{F}_k)_{k=1}^n$  nem negatív szubmartingál, és  $p > 1$ , akkor

$$\left\| \max_{1 \leq k \leq n} X_k \right\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p \doteq q \|X_n\|_p.$$

# Bizonyítás I

Vezessük be az  $X_n^* \doteq \max_{1 \leq k \leq n} X_k$  jelölést. Ha  $\|X_n\|_p = \infty$ , akkor az állítás evidens. Tegyük fel, hogy  $\|X_n\|_p < \infty$ . Elvileg előfordulhat, hogy  $\|X_n^*\|_p = \infty$ , ezért az  $X_n^*$  változót le kell vágni. Rögzítsük az  $N$  számot, és legyen  $\eta \doteq \min(N, X_n^*) \geq 0$ . Vezessük be az  $A(x) \doteq \{X_n^* \geq x\}$  jelölést. Az első Doob-egyenlőtlenség alapján

$$x\mathbf{P}(A(x)) \leq \int_{A(x)} X_n d\mathbf{P}.$$

## Bizonyítás II

A Newton–Leibniz-formula, a Fubini-tétel és a fenti becslés szerint

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\eta^p) &= \mathbf{E}\left(\int_0^\eta px^{p-1} dx\right) = \mathbf{E}\left(\int_0^N px^{p-1}\chi_{A(x)} dx\right) = \\ &= p \int_0^N x^{p-1} \int_\Omega \chi_{A(x)} d\mathbf{P} dx = p \int_0^N x^{p-1} \mathbf{P}(A(x)) dx \leq \\ &\leq p \int_0^N x^{p-2} \int_{A(x)} X_n d\mathbf{P} dx = p \int_0^N \int_\Omega X_n x^{p-2} \chi_{A(x)} d\mathbf{P} dx = \\ &= p \int_\Omega X_n \int_0^\eta x^{p-2} dx d\mathbf{P} = \frac{p}{p-1} \int_\Omega X_n \eta^{p-1} d\mathbf{P}.\end{aligned}$$

## Bizonyítás III

A Hölder-egyenlőtlenség alapján

$$\mathbf{E}(\eta^p) \leq q \|X_n\|_p \|\eta^{p-1}\|_q = q \|X_n\|_p \mathbf{E}(\eta^p)^{1/q}.$$

Az  $\mathbf{E}(\eta^p)^{1/q}$  kifejezéssel átosztva (Ha a kifejezés nulla, akkor az egyenlőtlenség triviális.)  $\|\eta\|_p \leq q \|X_n\|_p$ . A monoton konvergencia tétel miatt

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\min(N, X_n^*)\|_p = \|X_n^*\|_p,$$

amiből az egyenlőtlenség már következik.

# Doob egyenlőtlenségek folytonos időhorizonton

## Theorem

Legyen  $X$  nem negatív szubmartingál és  $T \leq \infty$  az  $X$  értelmezési tartományának egy időpontja. Ha  $\lambda \geq 0$ , akkor

$$\lambda \mathbf{P} \left( \sup_{0 \leq t \leq T} X(t) \geq \lambda \right) \leq \mathbf{E}(|X(T)|).$$

Ha  $p > 1$ , akkor

$$\left\| \sup_{0 \leq t \leq T} X(t) \right\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X(T)\|_p \doteq q \|X(T)\|_p.$$

Legyen  $(t_k^{(n)})$  a  $[0, T]$  szakasz egy egyre finomodó infinitezimális particiója. Mivel minden partició a korábbi finomítása a szuprémumok nőnek és mivel a szubmartingál nem negatív, így a bal oldalon használható a monoton konvergencia tétele. A jobb oldal pedig konstans módon azonos.

# Martingálok szuprémumának integrálhatósága

## Theorem

*Ha  $X$  martingál és  $p > 1$ , akkor*

$$X^* \stackrel{\circ}{=} \sup_t |X(t)| \in L^p(\Omega)$$

*pontosan akkor, ha az  $X$  korlátos az  $L^p$  térben.*

Ha  $X$  martingál, akkor  $|X|^p$  nem negatív szubmartingál, ugyanis martingál konvex függvénye szubmartingál. Ebből, ha  $|X|^p$  integrálja korlátos akkor az  $X^*$  integrálja is korlátos. A fordított irány az  $|X(t)| \leq X^*$  miatt triviális.

# Az integrálható martingálok terei

## Definition

Valamely  $M$  martingálra definíció szerint  $M \in \mathcal{H}^p$ ,  $p \geq 1$ , ha  $X^* \doteq \sup_t |X(t)| \in L^p(\Omega)$ . A térben a normát a

$$\|X\|_p \doteq \left\| \sup_t |X(t)| \right\|_p$$

kifejezés definiálja.

Ha  $p > 1$ , akkor az  $M \in \mathcal{H}^p$  ekvivalens avval, hogy az  $M$  martingál korlátos az  $L^p(\Omega)$  térben. Ha  $p = 1$ , akkor ez nem igaz.



# Az integrálható martingálok terei

## Theorem

A  $\mathcal{H}^p$  terek Banach-terek.

Mivel egy adott filtráció felett értelmezett martingálok lineáris teret alkotnak a  $\mathcal{H}^p$  terek triviálisan normált terek. Ha  $(M_n)$  egy Cauchy-sorozat, és  $\delta_k \searrow 0$ , akkor egy alkalmas részsorozatra  $\|M_{n_k} - M_{n_{k+1}}\|_p < \delta_k$ . Az integrál definíciója miatt

$$(2^{-k})^p \mathbf{P} \left( \sup_t |M_{n_{k+1}}(t) - M_{n_k}(t)| > 2^{-k} \right) \leq \delta_k^p,$$

így esetleg újabb részsorozatra áttérve feltehető, hogy

$$\mathbf{P} \left( \sup_t |M_{n_{k+1}}(t) - M_{n_k}(t)| > 2^{-k} \right) < 2^{-k}.$$

## Az integrálható martingálok terei

A Borel-Cantelli lemma miatt az egyenlőtlenség majdnem minden kimenetelre csak véges sok esetben teljesülhet, így az  $(M_{n_k})$  részsorozat trajektóriái az egyenletes konvergencia topológiában Cauchy-sorozatot alkotnak. Mivel a reguláris függvények az egyenletes konvergenciára nézve Banach-teret alkotnak létezik  $M$  reguláris folyamat, amelyre  $\sup_t |M_{n_k}(t) - M(t)| \xrightarrow{m.m.} 0$ . A Fatou-lemma miatt ha  $n$  és  $k$  elég nagy

$$\begin{aligned} \|M_n - M\|_p &= \left\| \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_t |M_n(t) - M_{n_k}(t)| \right\|_p \leq \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left\| \sup_t |M_n(t) - M_{n_k}(t)| \right\|_p = \liminf_{k \rightarrow \infty} \|M_n - M_{n_k}\|_p < \varepsilon. \end{aligned}$$

## Az integrálható martingálok terei

Így  $M_n \rightarrow M$  a  $\mathcal{H}^p$  térben, feltéve, hogy ha az  $M$  is martingál.

$$\begin{aligned} \|M_n(t) - M(t)\|_p &\leq \left\| \sup_t |M_n(t) - M(t)| \right\|_p \stackrel{\circ}{=} \\ &\stackrel{\circ}{=} \|M_n - M\|_p \rightarrow 0, \end{aligned}$$

így az  $M_n(t)$  tart az  $M(t)$ -hez az  $L^p(\Omega)$  térben. Mivel  $p \geq 1$  a konvergencia az  $L^1(\Omega)$  térben is érvényes és mivel a feltételes várható érték folytonos az  $L^1(\Omega)$  térben, ezért ha  $t > s$ , akkor az

$$\mathbf{E}(M_n(t) \mid \mathcal{F}_s) = M_n(s)$$

egyenlőségben határértéket véve

$$\mathbf{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_s) = M(s).$$

# Négyzetesen integrálható martingálok terei

## Theorem

A  $\mathcal{H}^2$  martingálok esetén a norma ekvivalens a  $(M, N) \doteq (M(\infty), N(\infty))$  skaláris szorzat által generált Hilbert-tér struktúrával.

A Doob-egyenlőtlenség miatt

$$\|M\|_2 \doteq \|M^*(\infty)\|_2 \leq \frac{2}{2-1} \|M(\infty)\|_2 = (M(\infty), M(\infty)) \doteq (M, M).$$

Másrészt az energiaazonosság miatt az  $(M(n), M(n))$  sorozat monoton nő és  $L^2(\Omega)$ -ban  $M(n) \rightarrow M(\infty)$ , így

$$\begin{aligned} (M, M) &\doteq (M(\infty), M(\infty)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (M(n), M(n)) \leq \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left\| \sup_{t \leq n} |M(t)| \right\|_2^2 = \left\| \sup_t |M(t)| \right\|_2^2 = \|M\|_2^2. \end{aligned}$$

# A folytonos integrálható martingálok terei

## Theorem

*A folytonos  $\mathcal{H}^p$  martingálok a  $\mathcal{H}^p$ -martingálok zárt alterét alkotják.*

Legyen  $M_n \rightarrow M$  és legyen az  $(M_n)$  folytonos. A norma definíciója miatt  $\sup_t |M_n(t) - M(t)| \in L^p(\Omega)$ -ben nullához tart. De akkor egy alkalmas részsorozatra

$$\sup_t |M_{n_k}(t) - M(t)| \xrightarrow{m.m.} 0.$$

Az egyenletes konvergencia megőrzi a folytonosságot, így az  $M$  trajektóriái majdnem minden kimenetelre folytonosak, így az  $M$  definíció szerint folytonos martingál.

# A folytonos négyzetesen integrálható martingálok tere

## Theorem

*A folytonos  $\mathcal{H}^2$  martingálok Hilber-teret alkotnak az  $(M, N) = (M(\infty), N(\infty))$  skaláris szorzattal.*