

# Itô-formula

A sztochasztikus folyamatok egyik legfontosabb formulája

Medvegyev Péter  
Matematika tanszék

2008

# Az Itô-formula

## Theorem

*Ha  $F$  kétszer folytonosan deriválható  $n$ -változós függvény, és  $(X_k)_{k=1}^n$  folytonos szemimartingálok, akkor tetszőleges  $t$  időpontra*

$$F(X(t)) - F(X(0)) = \sum_{k=1}^n \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x_k}(X(s)) dX_k(s) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(X(s)) d[X_i, X_j](s).$$

## Az Itô-formula

A formulának számos olvasata van. Először tegyük fel, hogy az  $X$  egy lokális martingál. Ha  $F$  egy kétszer folytonosan deriválható függvény, akkor az  $F(X)$  szintén sztochasztikus folyamat, amely értéke egy  $(t, \omega)$  pontban éppen  $F(X(t, \omega))$ . A formula szerint ez a transzformált sztochasztikus folyamat két folyamat összegére bontható. Az első, mivel az  $X$  most egy lokális martingál, egy lokális martingál szerinti sztochasztikus integrál, vagyis egy lokális martingál. A második egy véges változású folyamat, az  $[X]$ , szerinti sztochasztikus integrál, vagyis egy véges változású folyamat. Vagyis az  $F(X)$  transzformált folyamat egy lokális martingál és egy véges változású tag összegére bontható, vagyis egy szemimartingál. Másképpen az Itô-formula szerint egy lokális martingál kétszer folytonosan deriválható függvénye szemimartingál.

## Az elsőrendű közelítés

Rögzítsünk egy  $[a, b]$  szakaszt és vegyük a szakasz egy  $(t_k)$  particióját. Tekintsük az

$$F(X(b)) - F(X(a)) = \sum_k (F(X(t_k)) - F(X(t_{k-1})))$$

teleszkópikus felbontást. A közönséges Newton-Leibniz-szabály esetén

$$\begin{aligned} F(X(t_{k+1})) - F(X(t_k)) &\approx F'(X(\tau_k))(X(t_{k+1}) - X(t_k)) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(X(\tau_k))(X_i(t_{k+1}) - X_i(t_k)). \end{aligned}$$

Vegyük észre, hogy az így kapott

$$\sum_k \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(X(\tau_k))(X_i(t_k) - X_i(t_{k-1}))$$

összeg általában nem konvergál a megfelelő sztochasztikus integrálokhoz, ugyanis a  $\tau_k$  közelítő pontokat nem a  $[t_{k-1}, t_k]$  szakaszok kezdőpontjának kaptuk.

## A másodrendű közelítés

A teleszkopikus összeget becsülhetnénk másképpen is. Ennek a klasszikus esetben nincs értelme, most azonban célszerű, ha a Taylor-formula által biztosított

$$F'(X(t_{k-1})) (X(t_k) - X(t_{k-1})) + \frac{1}{2} F''(X(\tau_k)) (X(t_k) - X(t_{k-1}))$$

másodrendű közelítéssel élünk. A második derivált egy kvadratikus alak, így az  $X(\tau_k)$  pontban vett  $F''$  második derivált az  $X(t_k) - X(t_{k-1})$  helyen éppen

$$(X(t_k) - X(t_{k-1}))^T \cdot H \cdot (X(t_k) - X(t_{k-1}))$$

módon írható, ahol  $H \doteq \left( \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} (X(\tau_k)) \right)$  a második parciális deriváltakból álló Hesse-mátrix. Tehát a másodrendű tag

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} (X(\tau_k)) \Delta X_i(t_k) \Delta X_j(t_k).$$

## A másodrendű közelítés

A Taylor-formula szerint a másodrendű tagban levő  $\tau_k$  továbbra is a  $[t_{k-1}, t_k]$  egy alkalmas köztes pontja, de a köztes  $\tau_k$  az elsőrendű tagban nem szerepel csak a másodrendű tagban. Az elsőrendű közelítés éppen az

$$\int_a^b F'(X) dX = \sum_{i=1}^n \int_a^b \frac{\partial F}{\partial x_i}(X) dX_i$$

sztochasztikus integrálokhoz tart. Mivel a keresztvariáció növekményének becslése alapján

$$\Delta X_i(t_k) \Delta X_j(t_k) \approx \Delta [X_i, X_j](t_k)$$

ezért

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(X(\tau_k)) \Delta X_i(t_k) \Delta X_j(t_k) \approx \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(X(\tau_k)) \Delta [X_i, X_j](t_k).$$

# A másodrendű közelítés

Tehát

$$\begin{aligned} \sum_k \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} (X(\tau_k)) \Delta X_i(t_k) \Delta X_j(t_k) &\approx \\ &\approx \sum_k \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} (X(\tau_k)) \Delta [X_i, X_j](t_k) \\ &\rightarrow \int_a^b \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} (X(t)) d[X_i, X_j](t). \end{aligned}$$

Vegyük észre, hogy a másodrendű tagokból képzett integrál a négyzetes keresztvariáció szerint képzett integrál, vagyis közös Stieltjes-integrál, így az a tény, hogy a  $\tau_k$  nem az intervallum kezdőpontja nem okoz gondot.

## A másodrendű közelítés

Az Itô-formula a Newton–Leibniz-szabály általánosítása. A két formula különbsége a másodrendű tagokban van. A klasszikus analízisben a másodrendű tagok értéke nulla lenne, ugyanis ha egy  $F$  függvény kétszer folytonosan deriválható, akkor az  $F''$  folytonos függvény az  $[a, b]$  véges szakaszon korlátos, tehát

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2} \sum_k F''(\tau_k) (t_k - t_{k-1})^2 \right| &\leq \frac{1}{2} K \sum_k (t_k - t_{k-1})^2 \leq \\ &\leq \frac{1}{2} K \max_k |t_k - t_{k-1}| \sum_k (t_k - t_{k-1}) = \\ &= \frac{1}{2} K \max_k |t_k - t_{k-1}| (b - a) \rightarrow 0. \end{aligned}$$



## Időtől függő alak

A többdimenziós Itô-formula speciális esete amikor  $Y(s) \doteq F(s, X(s))$ , ahol az  $F$  egy kétváltozós, kétszer folytonosan deriválható függvény. Az Itô-formula szerint

$$\begin{aligned} Y(b) - Y(a) &= F(b, X(b)) - F(a, X(a)) = \\ &= \int_a^b \frac{\partial F}{\partial s}(s, X(s)) ds + \int_a^b \frac{\partial F}{\partial X}(s, X(s)) dX(s) + \\ &+ \frac{1}{2} \int_a^b \frac{\partial^2 F}{\partial s^2}(s, X(s)) d[s] + \frac{1}{2} \int_a^b \frac{\partial^2 F}{\partial X^2}(s, X(s)) d[X](s) + \\ &+ \int_a^b \frac{\partial^2 F}{\partial s \partial X}(s, X(s)) d[s, X](s). \end{aligned}$$

## Időtől függő alak

Könnyen belátható, hogy tetszőleges véges  $[a, b]$  szakaszon  $[s] = 0$ . Valóban, triviális módon

$$\sum_k \left( s_k^{(n)} - s_{k-1}^{(n)} \right)^2 \leq \max_k \left| s_k^{(n)} - s_{k-1}^{(n)} \right| \sum_k \left| s_k^{(n)} - s_{k-1}^{(n)} \right|.$$

Az összeg éppen  $b - a$ . Mivel a felbontás finomsága definíció szerint nullához tart a növekmények négyzetes összege nullához tart. A keresztvariáció szintén nulla, ugyanis az  $X$  trajektóriáinak folytonossága miatt

$$\begin{aligned} |[s, X](t)| &\approx \left| \sum_k (s_k - s_{k-1}) (X(s_k) - X(s_{k-1})) \right| \leq \\ &\leq t \cdot \max_k |X(s_k) - X(s_{k-1})| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

## Időtől függő alak

A másodrendű tagban tehát három tényező elhagyható, így

$$\begin{aligned} F(b, X(b)) - F(a, X(a)) &= \int_a^b \frac{\partial F}{\partial s}(s, X(s)) ds + \\ &+ \int_a^b \frac{\partial F}{\partial x}(s, X(s)) dX(s) + \\ &+ \frac{1}{2} \int_a^b \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X(s)) d[X](s). \end{aligned}$$

## Parciális integrálás formulája

A formula jobb megértése céljából érdemes megvizsgálni a parciális integrálás formulája és az Itô-formula kapcsolatát. Egyrészt az Itô-formulából következik a parciális integrálás formulája: Ha  $F(x, y) \stackrel{\circ}{=} xy$ , akkor alkalmazható az Itô-formula. Mivel  $\partial F / \partial y = x$ ,  $\partial F / \partial x = y$ , a két másodrendű parciális derivált nulla, valamint a vegyes parciális derivált éppen 1, ezért

$$F(X(b), Y(b)) - F(X(a), Y(a)) = X(b)Y(b) - X(a)Y(a) = \int_a^b X dY + \int_a^b Y dX + 2 \frac{1}{2} \int_a^b 1 d[X, Y],$$

amiből a parciális integrálás formulája evidens.

## Parciális integrálás formulája

Az Itô-formula egyik igen elegáns bizonyítása arra épül, hogy a parciális integrálás formulájával belátjuk az Itô-formulát polinómokra, majd az  $F$  függvényt és deriváltjait egyenletesen megközelítjük polinómokkal, illetve a polinóm, megfelelő deriváltjaival. Könnyen látható, hogy az Itô-formula lineáris, vagyis ha igaz egy  $F$  és egy  $G$  függvényre, akkor igaz az  $F + G$  függvényre is. Elegendő tehát a formulát csak az  $F(x) = x^n$  alakú polinómokra igazolni. Ezt indukcióval végezhetjük el. Ha  $n = 0$ , akkor  $x^n \equiv 1$ , és a formula triviálisan igazolható. Ugyancsak triviális az  $n = 1$  eset. Ilyenkor a formula az

$$X(b) - X(a) = \int_a^b 1dX + \frac{1}{2} \int_a^b 0d[X]$$

azonosságra egyszerűsödik.

## Parciális integrálás formulája

Ha  $n = 2$ , akkor a formula éppen

$$X^2(b) - X^2(a) = 2 \int_a^b X dX + [X],$$

ami a parciális integrálás formulából evidens. Tegyük fel, hogy az állítást már egy  $n$ -re igazoltuk, vagyis tegyük fel, hogy az

$$X^n - X^n(0) = nX^{n-1} \bullet X + \frac{n(n-1)}{2} X^{n-2} \bullet [X]$$

egyenlőséget már beláttuk. Az  $X^{n+1} = X^n \cdot X$  szereposztással alkalmazva a parciális integrálás formuláját

$$X^{n+1} - X^{n+1}(0) = X^n \bullet X + X \bullet X^n + [X^n, X].$$

## Parciális integrálás formulája

Az  $X^n$  képletét beírva az  $X \bullet X^n$  integrálba az asszociativitási szabály alapján

$$X \bullet X^n = nXX^{n-1} \bullet X + \frac{n(n-1)}{2}XX^{n-2} \bullet [X].$$

A polaritási formula szerint

$$[X^n, X] = nX^{n-1} \bullet [X] + \frac{n(n-1)}{2}X^{n-2} \bullet [[X], X].$$

Vegyük észre, hogy az  $[X]$  korlátos változású az  $X$  folytonos, ezért a második integrál integrátora nulla, így csak az első tag marad, vagyis

$$[X^n, X] = nX^{n-1} \bullet [X].$$

## Parciális integrálás formulája

A két képletet a parciális integrálás formulájába visszaírva a jobb oldal

$$(n+1)X^n \bullet X + \frac{n(n-1)}{2}X^{n-1} \bullet [X] + nX^{n-1} \bullet [X]$$

amely éppen

$$(n+1)X^n \bullet X + \frac{n(n-1) + 2n}{2}X^{n-1} \bullet [X]$$

ami pedig

$$(n+1)X^n \bullet X + \frac{n((n-1) + 2)}{2}X^{n-1} \bullet [X]$$

vagyis éppen a formula  $n+1$  kitevőre.



# Karakterisztikus függvények kiszámolása

## Example

Normális eloszlás karakterisztikus függvénye Itô-formulával.

Elegendő kiszámolni az  $N(0, 1)$  karakterisztikus függvényét. A  $z \mapsto \exp(itz)$  kifejezés mint komplexből komplexbe ható leképezés tekinthető  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  kétszer deriválható függvénynek. Külön alkalmazva a formulát a valós és a komplex részre az Itô-formula alapján

$$\begin{aligned} \exp(itw(s)) - \exp(itw(0)) &= it \int_0^s \exp(itw(u)) dw(u) + \\ &+ \frac{1}{2} (it)^2 \int_0^t \exp(itw(u)) d[w(u)]. \end{aligned}$$

## Karakterisztikus függvények kiszámolása

A két oldalon várható értéket véve:

$$\mathbf{E}(\exp(itw(s))) - 1 = -\frac{1}{2}t^2 \mathbf{E}\left(\int_0^s \exp(itw(u)) du\right).$$

A két integrált felcserélve

$$\mathbf{E}(\exp(itw(s))) - 1 = -\frac{1}{2}t^2 \int_0^s \mathbf{E}(\exp(itw(u))) du.$$

Deriválva az

$$\frac{d}{ds} \mathbf{E}(\exp(itw(s))) = -\frac{1}{2}t^2 \mathbf{E}(\exp(itw(s))).$$

Az egyenletet megoldva

$$\mathbf{E}(\exp(itw(s))) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}s\right).$$

Ha  $s = 1$ , akkor  $w(s)$  eloszlása  $N(0, 1)$ , így

$$\varphi(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right).$$

## Karakterisztikus függvények kiszámolása

Ha a komplex számokat el akarjuk kerülni, akkor az Itô-formulát a  $w \mapsto \cos tw$  és  $w \mapsto \sin tw$  szereposztásokkal kell alkalmazni, majd a két oldal várható értékét venni. Minden esetben ki kell használni, hogy a sztochasztikus integrálok valódi martingálok, ugyanis az integrandusok korlátosak.

## Karakterisztikus függvények kiszámolása

$$\sin tw(s) - \sin tw(0) = t \int_0^s \cos tw(u) dw(u) - \frac{t^2}{2} \int_0^s \sin tw(u) du.$$

Ebből

$$\mathbf{E}(\sin tw(s)) - 1 = -\frac{t^2}{2} \int_0^s \mathbf{E}(\sin tw(u)) du,$$

vagyis a differenciálegyenlet

$$\frac{d}{ds} f(s) = -\frac{t^2}{2} f(s), \quad f(0) = 0,$$

amiből

$$\mathbf{E}(\sin tw(s)) = 0.$$

## Karakterisztikus függvények kiszámolása

$$\cos tw(s) - \cos tw(0) = -t \int_0^s \sin tw(u) dw(u) - \frac{t^2}{2} \int_0^s \cos tw(u) du.$$

Ebből

$$\mathbf{E}(\cos tw(s)) - 1 = -\frac{t^2}{2} \int_0^s \mathbf{E}(\cos tw(u)) du,$$

vagyis a differenciálegyenlet

$$\frac{d}{ds} f(s) = -\frac{t^2}{2} f(s), \quad f(0) = 1,$$

amiből

$$\mathbf{E}(\cos tw(s)) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}s\right).$$

## Lokális martingálok, amelyek nem martingálok

Mivel a lokális martingál szerinti sztochasztikus integrálok lokális martingálok, ezért lokális martingált könnyű csinálni. Ugyanakkor általában nem könnyű garantálni, hogy valódi martingált kapunk. A gond az, hogy az alábbi számolásban fel lehet-e cserélni a várható értéket és a határértéket: Mivel  $\tau_n \nearrow \infty$  és az  $X^{\tau_n}$  definíció szerint martingál, ezért

$$\begin{aligned} X(s) &= \lim_{n \rightarrow \infty} X(s \wedge \tau_n) \stackrel{\circ}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} X^{\tau_n}(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}(X^{\tau_n}(t) \mid \mathcal{F}_s) = \\ &= \mathbf{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X^{\tau_n}(t) \mid \mathcal{F}_s\right) \stackrel{\circ}{=} \mathbf{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X(t \wedge \tau_n) \mid \mathcal{F}_s\right) = \mathbf{E}(X(t) \mid \mathcal{F}_s). \end{aligned}$$

A határérték és a várható érték azonban általában nem cserélhető fel. A mértékelméletben belátott két kritérium általában nem használható. A monoton konvergencia tétel használata reménytelen, ugyanakkor általában nincs olyan integrálható  $\zeta$  majoráns, amelyre

$$|X(t, \omega)| \leq \zeta(\omega) \in L^1(\Omega).$$

# Integrálható lokális martingál, amely nem martingál

Ha ilyen van, akkor persze az

$$|X(t \wedge \tau_n)| \leq \zeta$$

is teljesül minden  $n$ -re, így a majorált konvergencia tétel használható. Egy másik kevésbé ismert kritérium a következő:

## Theorem

*Ha  $\zeta_n \rightarrow \zeta$  és a  $(\zeta_n)$  sorozat korlátos az  $L^p(\Omega)$  térben valamilyen  $p > 1$  esetén akkor*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}(\zeta_n \mid \mathcal{F}) = \mathbf{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n \mid \mathcal{F}\right) = \mathbf{E}(\zeta \mid \mathcal{F}).$$

A tétellel kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy az állítás  $p = 1$  esetén már nem igaz.

## Integrálható lokális martingál, amely nem martingál

A kritérium speciális esete egy általánosabb kritériumnak, amelyre mint a  $(\zeta_n)$  sorozat egyenletes integrálhatóságára szokás hivatkozni. Ha az egyenletes integrálhatósági kritériumot használni akarjuk, akkor a

$$\zeta_n \doteq X(t \wedge \tau_n)$$

sorozatnak kell az  $L^p(\Omega)$  térben korlátosnak lenni. Az alábbi példa lényege, hogy ez nem következik az  $X(t)$  változók  $L^p(\Omega)$  korlátosságából. Vagyis előfordulhat, hogy a folyamat értékeiből álló halmaz  $L^p(\Omega)$  korlátos, vagyis egyenletesen integrálható, de a megállított változók halmaza nem korlátos.



# Integrálható lokális martingál, amely nem martingál

## Example

Létezik  $L^2$ -ben korlátos lokális martingál, amelyik nem martingál. Tekintsünk az  $\mathbb{R}^3$  térben egy  $\mathbf{w}$  standard Wiener-folyamatot. Ez definíció szerint azt jelenti, hogy a koordináták független Wiener-folyamatok. A  $t = 0$  pontból eredő problémák elkerülése céljából tegyük fel, hogy a  $\mathbf{w}$  folyamatot csak a  $t \geq 1$  időpontokra vizsgáljuk. Később meg fogjuk mutatni, hogy mivel a dimenzió három, majdnem minden kimenetelre  $\mathbf{w}(t) \neq 0$ . Ugyancsak később látni fogjuk, hogy ismételten a három dimenzió miatt ha  $t \rightarrow \infty$ , akkor

$$R(t) \stackrel{\circ}{=} \|\mathbf{w}(t)\|_2 \rightarrow \infty.$$

# Független növekményű folyamatok összege

## Lemma

Ha  $X_1$  és  $X_2$  függetlenek és független növekményűek, akkor az  $X_1 + X_2$  is független növekményű.

$X_1$  és  $X_2$  pontosan akkor függetlenek, ha tetszőleges  $(t_i)$  sorozatra az  $(X_1(t_i))$  és az  $(X_2(t_i))$  vektorok függetlenek. Legyen  $t > s$  és  $\xi_i \doteq X_i(s)$  és  $\eta_i \doteq X_i(t+h) - X_i(t)$ . Az együttes eloszlásokat felírva, először a függetlenséget, majd a független növekményeket, majd ismét a függetlenséget használva

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(\xi_1 \in B_1, \xi_2 \in B_2, \eta_1 \in C_1, \eta_2 \in C_2) = \\ & \mathbf{P}(\xi_1 \in B_1, \eta_1 \in C_1) \mathbf{P}(\xi_2 \in B_2, \eta_2 \in C_2) = \\ = & \mathbf{P}(\xi_1 \in B_1) \mathbf{P}(\eta_1 \in C_1) \mathbf{P}(\xi_2 \in B_2) \mathbf{P}(\eta_2 \in C_2) = \\ = & \mathbf{P}(\xi_1 \in B_1, \xi_2 \in B_2) \mathbf{P}(\eta_1 \in C_1, \eta_2 \in C_2). \end{aligned}$$

# Független növekményű folyamatok összege

A monoton osztály tétel segítségével

$$\mathbf{P}((\tilde{\zeta}_1, \tilde{\zeta}_2) \in B, (\eta_1, \eta_2) \in C) = \mathbf{P}((\tilde{\zeta}_1, \tilde{\zeta}_2) \in B) \mathbf{P}((\eta_1, \eta_2) \in C)$$

amiből a  $\tilde{\zeta}_1 + \tilde{\zeta}_2$  független az  $\eta_1 + \eta_2$ -től. A gondolatmenetet kettő helyett véges sok változóra alkalmazva kapjuk a lemmát.

# Független Wiener-folyamatok kvadratikus keresztvariációja nulla

Ha a  $w_1$  és a  $w_2$  független, akkor  $[w_1, w_2] = 0$ . Ugyanis

$$[w_1, w_2] = \frac{1}{4} ([w_1 + w_2] - [w_1 - w_2]).$$

De a függetlenség miatt a  $[w_1 \pm w_2] / \sqrt{2}$  Wiener-folyamatok, így a kvadratikus variációik megegyezik. (Mivel független növekményűek elegendő az eloszlásokat kiszámolni.)

Ebből következően többdimenziós Wiener-folyamat esetén az Itô-formulában a másodrendű tagban a vegyes tagok nullák, vagyis a másodrendő tag

$$\frac{1}{2} \int_0^t \sum_i \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(\mathbf{w}(s)) ds.$$

# Harmonikus függvények és az Itô-formula

## Definition

Valamely  $f$  többváltozós függvényt harmonikusnak mondunk, ha

$$\Delta f \doteq \sum_i \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f = 0.$$

# Harmonikus függvények és az Itô-formula

Ebből következően ha  $\mathbf{w}$  standard Wiener-folyamat, akkor

$$f(\mathbf{w}(t)) - f(\mathbf{w}(0)) = \sum_i \int_0^t \frac{\partial}{\partial x_i} f(\mathbf{w}(s)) dw_i(s) + \frac{1}{2} \int_0^t \Delta f(s) ds.$$

Ha  $f$  harmonikus, akkor

$$f(\mathbf{w}(t)) - f(\mathbf{w}(0)) = \sum_i \int_0^t \frac{\partial}{\partial x_i} f(\mathbf{w}(s)) dw_i(s).$$

A sztochasztikus integrálok lokális martingálok, így ha az  $f$  harmonikus, akkor az  $X(t) \stackrel{\circ}{=} f(\mathbf{w}(t))$  folyamat lokális martingál.

# Harmonikus függvények és az Itô-formula

## Example

Ha  $n = 3$ , akkor az  $f(x) = 1/\|x\| \stackrel{\circ}{=} 1/r$  függvény harmonikus az  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  tartományon.

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} 2x_i = \frac{x_i}{r}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x_i} = -\frac{x_i}{r^3}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} &= -\frac{1 \cdot r^3 - x_i 3r^2 \partial r / \partial x_i}{r^6} = -\frac{1 \cdot r^3 - x_i 3r^2 x_i / r}{r^6} = \\ &= -\frac{1 \cdot r^3 - x_i^2 3r}{r^6}. \end{aligned}$$

$$\Delta f \stackrel{\circ}{=} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f = -\frac{3r^3 - 3r(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}{r^6} = -\frac{3r^3 - 3r \cdot r^2}{r^6} = 0.$$

# Harmonikus függvények és az Itô-formula

Következésképpen az Itô-formula miatt az

$$\begin{aligned} M(t) &\stackrel{\circ}{=} \frac{1}{R(t)} \stackrel{\circ}{=} \frac{1}{\sqrt{w_1^2(t) + w_2^2(t) + w_3^2(t)}} = \\ &\stackrel{\circ}{=} f(w_1(t), w_2(t), w_3(t)) \end{aligned}$$

lokális martingál, ugyanis a másodrendű tagokat tartalmazó korrekciós tag az Itô-formulában a  $\Delta f = 0$  miatt nulla. Ahhoz, hogy a példa kész legyen meg kell mutatni, hogy az  $M$  nem valódi martingál, de korlátos  $L^2(\Omega)$ -ban.



## A lokális martingál korlátos a négyzetesen integrálható függvények körében

A koordináták függetlensége miatt a  $(w_1(t), w_2(t), w_3(t))$  együttes sűrűségfüggvénye a normális eloszlás sűrűségfüggvénye alapján

$$\prod_{k=1}^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x_k^2}{2t}\right)$$

Megmutatjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(M^2(t)) &\stackrel{\circ}{=} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sum_k x_k^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^3} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_k \frac{x_k^2}{t}\right) d\lambda_3(\mathbf{x}) \leq \\ &\leq K < \infty, \end{aligned}$$

vagyis hogy az  $M$  folyamat az  $L^2(\Omega)$  térben korlátos. Ha  $\|\mathbf{x}\| \geq 1$  akkor az integrál felülről becsülhető az  $\mathbf{P}(\|\mathbf{w}(t)\| \geq 1) \leq 1$  valószínűséggel. Ha  $\|\mathbf{x}\| \leq 1$ , akkor a  $t \geq 1$  miatt az integrandus második fele nem nagyobb mint  $1/(\sqrt{2\pi})^3$ .

## Korlátosság

Jelölje  $B$  az  $\mathbb{R}^n$  tér egységgömbjét. Így elegendő megvizsgálni az  $\int_B \|x\|^{-\alpha} d\lambda_n$  típusú integrálok konvergenciáját. Legyenek  $n$  és  $\alpha$  tetszőlegesek. Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a norma a maximum norma.

$$G(k) \doteq \left\{ 1/2^{k+1} < \|x\| \leq 1/2^k \right\},$$

akkor

$$\begin{aligned} \int_B \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n &= \int_{B \setminus \{0\}} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n = \\ &= \int_{\cup_k G(k)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n = \sum_k \int_{G(k)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n. \end{aligned}$$

## Korlátosság

A szumma mögött álló integrál minden  $k$ -ra triviálisan véges. Mivel

$$2^k G(k) = G(0) = \{1/2 < \|x\| \leq 1\},$$

ezért a helyettesítéses integrálás koordinátánként alkalmazva  $n$  helyettesítés után

$$\begin{aligned} \int_{G(0)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n &= \int_{G(k)} \frac{1}{\|2^k x\|^\alpha} (2^k)^n d\lambda_n = \\ &= 2^{k(n-\alpha)} \int_{G(k)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n. \end{aligned}$$

# Korlátosság

Amiből

$$\int_B \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n = \int_{G(0)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} d\lambda_n \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k(n-\alpha)},$$

és ez utóbbi éppen akkor konvergens, ha  $n > \alpha$ . Mivel most  $n = 3$  és  $\alpha = 2$ , ezért az integrál, miként állítottuk véges.

## A végtelenben való viselkedés

Az  $n = 3$  feltétel miatt a Wiener-folyamat nomája majdnem mindenhol végtelenhez tart, ezért  $\lim_{t \rightarrow \infty} M(t) = 0$ . Az  $L^2$ -korlátosság miatt a folyamat egyenletesen integrálható. Így a konvergencia nem csak majdnem mindenhol, hanem  $L^1$ -ben is teljesül, vagyis

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{E}(M(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} \|M(t)\|_1 = 0.$$

## Az ellentmondás egyenletes integrálhatósággal

Ha  $M$  martingál lenne és  $t < s$ , akkor

$$M(t) = \mathbf{E}(M(s) \mid \mathcal{F}_t).$$

A torony-szabályból következő

$$\begin{aligned} \|\mathbf{E}(\xi \mid \mathcal{F}) - \mathbf{E}(\eta \mid \mathcal{F})\|_1 &\stackrel{\circ}{=} \mathbf{E}(|\mathbf{E}(\xi - \eta \mid \mathcal{F})|) \leq \\ &\leq \mathbf{E}(\mathbf{E}(|\xi - \eta| \mid \mathcal{F})) = \\ &= \mathbf{E}(|\xi - \eta|) \stackrel{\circ}{=} \|\xi - \eta\| \end{aligned}$$

egyenlőtlenség miatt a feltételes várható érték az  $L^1$ -konvergencia szerint folytonos, így

$$\begin{aligned} M(t) &= \lim_{s \rightarrow \infty} M(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} \mathbf{E}(M(s) \mid \mathcal{F}_t) = \\ &= \mathbf{E}\left(\lim_{s \rightarrow \infty} M(s) \mid \mathcal{F}_t\right) = \mathbf{E}(0 \mid \mathcal{F}_t) = 0 \end{aligned}$$

lenne, ami lehetetlen.

## Az ellentmondás közvetlen igazolása

Az ellentmondás az egyenletes integrálhatóságra való hivatkozás nélkül is kicsikarható. Ha az  $M$  martingál lenne, akkor alkalmazható lenne az energiaazonosság. Így minden  $t < s$  esetén

$$\|M(s) - M(t)\|^2 = \|M(s)\|^2 - \|M(t)\|^2.$$

Ebből következően az  $s \mapsto \|M(s)\|$  monoton növekedő lenne. Mivel korlátos, ezért a végtelenben konvergens lenne. Ebből következően az  $(M(s))$  Cauchy-sorozat lenne, így az  $L^2(\Omega)$  tér teljessége miatt a  $\lim_{s \rightarrow \infty} M(s)$  határérték  $L^2(\Omega)$ -ban is létezne. Mivel minden  $L^2$ -ben konvergens sorozatnak van majdnem mindenhol konvergens részsorozata, amely sorozat határértéke, miként tudjuk, nulla, ezért az  $L^2(\Omega)$ -ban vett határérték szintén nulla. Így  $\|M(t)\| \leq \lim_{s \rightarrow \infty} \|M(t)\| = 0$ , vagyis az  $M$  azonosan nulla lenne.